

## Lesben in den USA – ausgegrenzt

Dass psychiatrische Fachgesellschaften in den USA erklären, sexuelle Orientierung habe nichts mit Geisteskrankheiten zu tun, mutet eigentlich überflüssig an. Aber auch im Bereich der Gynäkologie ist erstaunlich, dass sich laut einer Umfrage ein Drittel der lesbischen Frauen ihrem Arzt nicht offenbart. Vorsorgeuntersuchungen werden seltener in Anspruch genommen, wobei manche Randgruppen,

auch bedingt durch soziologische Faktoren, gleichzeitig höhere Risikofaktoren (Übergewicht etc.) tragen.

Bei der Familienplanung stoßen lesbische Paare in Kliniken oft auf Hindernisse. Die Ausgrenzung dieser Familienformen wirkt sich langfristig auch auf die Gesundheit der Kinder aus. (MF)

■ O'hanlan KA et al.: *Obstet Gynecol* 107 (2006) 709-714  
✕ Bestellnummer 062283

## KASUISTIK

### Leihmutter aus der Familie

Bei einer 38-jährigen Frau traten nach erfolgreicher IVF Komplikationen auf, die eine Notfall-Scetio mit Hysterektomie unter Verlust der eingepflanzten Zwillinge erforderlich machten. Der 35-jährigen Schwester der Frau wurden nach entsprechender rechtlicher und psychologischer Beratung aller Beteiligten zwei der verbliebenen kryokonservierten Embryonen der 38-jährigen eingepflanzt. Nach normaler Schwangerschaft gebar

die Schwester termingerecht ein gesundes Kind.

Bei einer 28-jährigen Frau mit Uterus- und Vagina-Agenesie, aber normaler Ovarfunktion, war im Alter von 18 Jahren die Vagina erfolgreich rekonstruiert worden. Zwei IVF-Embryonen von ihr wurden der Schwägerin eingepflanzt. Diese brachte einen gesunden Jungen zur Welt. (CE)

■ Kavic SM et al.: *Arch Gynecol Obstet* 274 (2006) 240-242  
✕ Bestellnummer 063950

## Sectio? Hängt auch vom Geld ab

Epidemiologen analysierten die Daten aus 42 Erhebungen der Länder südlich der Sahara, Süd- und Südost-Asiens, Lateinamerikas und der Karibik.

In den ärmsten 20% der Bevölkerung betrug die Kaiserschnitttrate in 20 Ländern weniger als 1%, in sechs Ländern sogar bei 80% der Bevölkerung. Nur in fünf Ländern wies auch die ärmste Bevölkerungsschicht Kaiserschnittraten über 5% auf. Dagegen erreichten in sieben Ländern, überwiegend in Lateinamerika, mindestens 40% der Bevölkerung eine Kaiserschnitttrate von mehr als 15% (Grenzwert der als maximal notwendig

angesehenen Sectio-Rate aus medizinischen Gründen).

In den ärmsten Ländern, v. a. südlich der Sahara, haben weite Kreise der Bevölkerung also keinen Zugang zu lebensrettenden Kaiserschnitt-Operationen. Dagegen haben in manchen Ländern mit mittlerem Durchschnittseinkommen mehr als die Hälfte der Bevölkerung Kaiserschnittraten jenseits medizinischer Notwendigkeit. Die Politik ist gefordert, um die Müttersterblichkeit in diesen Ländern zu reduzieren. (CE)

■ Ronsmans C et al.: *Lancet* 368 (2006) 1516-1523  
✕ Bestellnummer 063797

## Zeugung von Nachkommen trotz fehlendem Y-Chromosom

*Cytogenet Genome Res* 16

### Kontrazeption

- Kampf dem Alkohol in der Schwangerschaft *J Am Board Fam Med* 17
- Risiko von Tubar-Sterilität durch Spirale *Gynecol Obstet Invest* 17
- Compliance bei Risikogruppen *Obstet Gynecol* 17
- Menstruations-Änderung nach „Pille danach“ *Contraception* 17

### Menopause

- Kardiale Risiken bestimmen den Zeitpunkt der Wechseljahre *J Am Coll Cardiol* 18
- Transdermales Östrogen bevorzugen *Symp.* 18

### Menstruation

- Was tun bei primärer Dysmenorrhö? *Obstet Gynecol* 19
- Uterusmuskulatur elektrisch relaxieren *Tohoku Exp Med* 19
- Menstruation kein Grund für Eisenmangel *Am J Hum Biol* 19
- Therapie des prämenstruellen Syndroms *J Reprod Med* 19

### Neonatalogie

- Hyperbilirubinämie: Droht Hirnschädigung? *N Engl J Med* 20
- Wieviel IQ enthält die Muttermilch? *BMJ* 20
- Schlechte Lungenfunktion: hohes Asthmarisiko? *N Engl J Med* 20
- State of the Art: Notfall nekrotisierende Enterokolitis *Lancet* 21
- Schmerzen post OP richtig einschätzen *Pediatrics* 22
- Bei welchen Frühchen Netzhaut-Screening? *Pediatrics* 22
- Nekrotisierende Enterokolitis: Laparotomie auch bei Frühchen nötig? *N Engl J Med* 22

### Onkologie

- Gewichtszunahme fördert Brustkrebs *JAMA* 23
- Brustkrebs: Gen-Signatur ist prädiktiv *N Engl J Med* 23
- HRT: Östrogen allein erhöht Ovarial-CA-Risiko *Br J Cancer* 23
- Hohe Mammogramm-Dichte als Warnsignal *N Engl J Med* 24
- Maligner Zervixtumor: Radikale vaginale Trachelektomie erhält Fertilität *Gynecol Oncol* 24
- Anti-Angiogenese bei Mamma-CA *Symp.* 24

### Pränataldiagnostik

- Anämiediagnostik mittels Duplexsonographie *N Engl J Med* 26
- US-Empfehlungen für Down-Screening *Obstet Gynecol* 26
- Outcome sakrokokzygealer Teratome *J Pediatr Surg* 26

### Psychische Erkrankungen

- Sexueller Missbrauch: Frauen leiden länger *J Psychosom Res* 27
- Schützen endogene neuroaktive Steroide vor Schwangerschaftsdepression? *Psychoneuroendocrinology* 27
- Prävention der Wochenbettdepression *Am J Psychiatry* 27

### Urologie

- Interventionen bei postoperativer Inkontinenz *N Engl J Med* 28
- Stressinkontinenz: gute Langzeitergebnisse mit TVT *BJOG* 28

- IM FOKUS Ausgewählte Studien für ausgewählte Leser 5
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 12
- IMPRESSUM 28
- STENO 30