



Onkologie
Die Früherkennung des Prostatakarzinoms gehört zu den wichtigsten Aufgaben des niedergelassenen Urologen. Welche Untersuchungen sinnvoll sind, lesen Sie im Schwerpunkt

ab Seite 18

Schwerpunkt Onkologie

Prostatakarzinom

- 18 Was macht Sinn bei der Früherkennung?
- 20 Pro und Kontra PSA-Screening
- 21 Prostatektomie: Welcher Patient in welchem Stadium?

Zweitmeinung

- 22 Service oder nur Geldmacherei?

Nierenzellkarzinom


- 23 Lokalisierter Tumor oft erst spät erkannt

Schmerztherapie

- 24 Keine Scheu vor Opioiden
- 25 Häufige Probleme in der Praxis

ÄP-Service

- 29 Fachbücher, Patienten-Ratgeber, Internet-Tipps



Täglich aktuelle
Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Ihre Wahl bei BPH!



Alfuzosin HEXAL® 10 mg
Retardtabletten

Wirkstoff: Alfuzosin-Hydrochlorid

Urologikum

Tamsulosin HEXAL® 0,4 mg retard

Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Wirkstoff: Tamsulosin-Hydrochlorid



Urologikum

20 Hartkapseln N1



www.urologie.hexal.de

NEU von HEXAL:
Alfuzosin HEXAL® 10 mg

bis **64%** Preisvorteil zu
Uroxatral® uno*

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



* Alfuzosin HEXAL 10 mg OP 100 vs. Uroxatral uno OP 100.
Lauer-Taxe, Stand: 01.07.2007

Alfuzosin HEXAL 10 mg Retardtabletten: Wirkstoff: Alfuzosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Retardtbl. enth. 10 mg Alfuzosin-HCl, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Povidon K25. **Anwendungsgeb.:** Behandl. der funktionellen Sympt. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe gleich. Einnahme v. and. Alpha1-Blockern, Leberinsuff., Komb. m. Dopamin-Rezeptoragonisten. **Nebenwirk.:** Häufig: Müdigkeit, Benommenh., Kopfschmerzen, Übelk., Oberbauchbeschwerden, Asthenie. **Gelegentl.:** Schläfrigkeit, Schwindel, Unwohlsein, gestörtes Sehvermögen, orthostat. Hypotonie, Synkopen, Tachyk., Palpitation, Rhinitis, Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenh., Hautausschlag, Pruritus, Harninkontinenz, Hitzewall., Ödeme, Brustschmerzen. **Sehr selten:** Verschlimm. od. Wiederauftreten einer Angina pectoris. **In Einzellf.:** Priapismus. **Enth.:** Lactose, Weiz. Einzellf. u. Hinz. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. **Verschreibungspflichtig.** **Mat.-Nr.:** 3303855 **Stand:** März 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>

Tamsulosin HEXAL 0,4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Wirkstoff: Tamsulosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetzung enth. 0,4 mg Tamsulosin-HCl, mikrokristall. Cellulose, Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdoodecylsulfat, Polysorbat 80, Talkum, Triethylcitrat, Drucktinte (Schlack, Eisen(III)-oxid (E 172), (3-sn-Phosphatidylcholin (Soja) Antischaummittel DC 1510), Farbst. E 132, E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Behandl. u. Sympt. des unteren Harntraktes b. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe (einschließl. arzneimittelinduziertes Angiodem.), anamnestisch bekannte orthostat. Hypotonie, schwere Leberinsuff. **Nebenwirk.:** Häufig: Schwindel. **Gelegentl.:** Kopfschmerzen, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrho, Übelk., Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urtikaria, anormale Ejakulation, Asthenie. **Selten:** Synkope, Angiodem., Weiz. Einzellf., Priapismus. **Enth.:** s. Fach- u. Gebrauchsinfo. **Verschreibungspflichtig.** **Mat.-Nr.:** 3303410 **Stand:** Januar 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>

Fotos: KES/Thieme (2), Bilderbox, Archiv Titelbild: Bilderbox