

ÄRZTE & ZEITUNG

DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

FRITAG 24. JULI 2007


D 8877 NR. 136 JAHRGANG 26



Jetzt 3D-Navigation bei Kardioversion

Ein neues Navigationssystem am Deutschen Herzzentrum Berlin erleichtert mit 3D-Bildern die Pulmonalvenen-Isolation. Die Therapiedauer kann halbiert werden.

MEDIZIN 4



Klinikum Heide setzt auf Video im OP

Solche Videokonferenzen können Ärzte am Westküstenklinikum Heide bald nutzen, um sich aus dem OP heraus eine Zweitmeinung von Kollegen zu holen.

WIRTSCHAFT 11



„Strategie für ein gesünderes Leben“

Im österreichischen Lech am Arlberg wird ein Urlaubskonzept mit wissenschaftlich gesicherten positiven Effekten auf die Gesundheit angeboten.

PANORAMA 12

DES TAGES Mallorca-Police – bei Mietwagen sinnvoll


Wer sich im Ausland einen Mietwagen leiht, ist manchmal schlecht versichert. Denn die Versicherungsbedingungen in der Haftpflicht sind in vielen Ländern wie Spanien oder Griechenland sehr viel niedriger als in Deutschland. Ein selbst verschuldeter Unfall kann dann teuer zu stehen kommen. Wegen einer zu geringen Deckung hilft eine Urlaubsversicherung für Mietwagen. So genannte Mallorca-Police für das spanische Ausland. Die Versicherung deckt dann die Differenz zwischen der ausländischen und der deutschen Deckungssumme ab. In jüngeren Haftpflichtverträgen ist dieser Schutz meist nur bei der eigenen Autoversicherung

COPD mit Einsekundenkapazität unter 50 – da sind Steroide nötig

Empfehlung in neuen Leitlinien / Sterberate bei FEV₁ unter 50 mehr als verdoppelt

NEU-ISENBURG (ikr). COPD-Patienten benötigen bereits dann inhalative Kortikoide, wenn die Einsekundenkapazität (FEV₁) unter 50 Prozent des Sollwertes liegt. Denn dann besteht nach der neuen Leitlinie eine schwere COPD. Solche Patienten haben vermehrt Exazerbationen, und die Sterberate ist nach Studien- daten mehr als verdoppelt.

Nach der alten COPD-Leitlinie gehörten Patienten mit einer FEV₁



len“, sagt Professor Claus Vogelmeier aus Marburg. Er hat federführend an der Leitlinie mitgewirkt, die auch ein wichtiges Thema in der heutigen Sommer Akademie

Studie, in der mehr als 15000 COPD-Kranke und Lungengesunde bis zu elf Jahre nachbeobachtet wurden (Respiratory Medicine 100, 2006, 115). Ergebnis: Von den 271 COPD-Patienten mit einem FEV₁ unter 50 starben 34 Prozent, von den 1484 Patienten mit einer FEV₁ zwischen 50 und 79 hingegen 16 Prozent und von den 8661 Lungengesunden fünf Prozent.

Die neuen Erkenntnisse haben Konsequenzen für die Therapie: So sollen Patienten mit einem



Unterwegs in Richtung Gipfel: Alberto Contador und Michael Rasmussen (links) Foto: dpa

DT. ZENTRALBIBLIOTHEK TEAM 5.1/ZS
GLEUELER STR. 60 50931 KOELN

041441

2.012 > 21

42372