

MEDICAL TRIBUNE

gang/Nr. 3 · 5963 · 31. Juli 2007

Aktuelle Zeitung für die Klinik

Legionellen in der Leitung


Bei Legionellen im Trinkwasser muss man Risikopatienten besonders schützen.

6

Akute Galle nicht liegen lassen

Entzündete Gallenblasen sollten am besten innerhalb der ersten vier Tage operiert werden.

3



Bakterien in Schach, aber Pusteln eingefangen

Meist sind Antibiotika der Auslöser. Was noch dahinterstecken kann und wie man therapiert:

12

eltest für mien

JRG/SAAR –
h genügend Sper-
m Kinderzeugen?“
age können sich
künftig mit einem
est selbst beantwor-
h 15 Min. wissen
ihre Fruchtbarkeit
l. Marburger Ärzte
elten einen Test-
der zeigt, wie viele
n das Ejakulat ent-
Mio. pro Milliliter
: zeugungsfähig.
oll nächstes Jahr

Leitliniengemäße Blutdrucktherapie

Nur noch individuelle Therapien sind gefragt

MAILAND – Auf Kochre-
zepte für die antihypertensive
Therapie wartet der Arzt ver-
geblich, denn die neuen Leit-
linien schreiben individuell

Hemmer, AT₁-Antagonisten,
Betablocker, Diuretika, Kalzi-
umantagonisten, ganz vorne
und nicht umsonst haben wir

im dritten Versuch jenes“ gibt
es nicht. Die speziellen Wirkei-
genschaften, Nebenwirkungen
und Begleiterkrankungen des

die Ventrikelhypertrophie ver-
hindern oder die Karotis frei
halten sollte, wird eine pas-
sende Substanz ausgesucht.

Venenkranke laufen besser strumpfgestützt

Sportler denken sicher, sie
hätten sich verhöhrt, wenn
ihr Arzt ihnen den Vor-
schlag macht, mit Kom-
pressionsstrümpfen zu lau-
fen, um das Fortschreiten
einer venösen Insuffizienz
zu verhindern. Den sport-
lichen Erfolgen tun die
Strümpfe keinen Abbruch.
Im Gegenteil: Durch Tex-
tilien komprimierte Beine

Anzeige

Band 2 ist da!

Heute schon gelacht?



Bestellcoupon unten!