



Epidemiologisches Bulletin

3. August 2007 / Nr. 31

AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN ZU INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

Mitteilung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut:

Neuerungen in den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI vom Juli 2007

Die STIKO hat im *Epidemiologischen Bulletin* 30/2007 die aktualisierten Impfempfehlungen (Stand: Juli 2007) veröffentlicht.

In der Vergangenheit haben sich als Arbeitsgrundlage die Veröffentlichung der Begründungen der aktualisierten Empfehlungen und eine zusammenfassende Darstellung der Neuerungen für die Praxis bewährt. Die Veröffentlichung der Empfehlung und Begründung der STIKO zur Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) für Mädchen von 12 bis 17 Jahren erfolgte bereits am 23. März 2007 im *Epidemiologischen Bulletin* 12/2007. Im Folgenden sind spezielle Hinweise und Erläuterungen zu den wichtigsten Änderungen in den STIKO-Empfehlungen des Jahres 2007 abschließend zusammengefasst.

Folgende **Abkürzungen** werden für Bestandteile der Impfstoffe entsprechend internationaler Vereinbarungen verwendet: **T** – Tetanus (unabhängig von der Antigen-Konzentration), **D** – Diphtherie mit hoher Toxinkonzentration, **d** – Diphtherie mit niedriger Toxinkonzentration, **aP** – azellulärer Pertussis-Impfstoff mit hoher Antigen-Konzentration, **ap** – azellulärer Pertussis-Impfstoff mit niedriger Antigen-Konzentration, **Hib** – *Haemophilus influenzae* Typ B, **HB** – Hepatitis B, **HPV** – humane Papillomaviren, **IPV** – Poliomyelitis (inaktivierter Impfstoff), **MMR** – Masern, Mumps und Röteln, **MMRV** – Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, **V** – Varizellen.

In Tabelle 2 der Empfehlungen der STIKO besteht eine Aufteilung in folgende Kategorien: **S** = Standardimpfung, **SM** = Standardimpfung für Mädchen, **I** = Indikationsimpfung für Risikogruppen, **B** = Impfung auf Grund eines erhöhten beruflichen Risikos, **R** = Impfung aufgrund von Reisen und **P** = postexpositionelle Prophylaxe bzw. Riegelungsimpfung.

Der neue Impfkalender der STIKO

Die STIKO empfiehlt seit längerem für **Kinder und Jugendliche (9 bis 17 Jahre)** die Auffrischimpfung gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis (mit Tdap-IPV), das Nachholen bisher nicht erfolgter Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln und Meningokokken der Serogruppe C sowie im Sinne einer „catch-up“-Strategie die Grundimmunisierung gegen Hepatitis B und Varizellen – wenn gegen diese Erkrankungen noch kein Schutz besteht.

Zusätzlich zu diesen bereits bestehenden Empfehlungen **zur Impfung Jugendlicher** empfiehlt die STIKO seit März 2007 eine **generelle Impfung gegen humane Papillomaviren (Typen HPV 16, 18) für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren**. Die Impfung mit 3 Dosen sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sein (s. Abschnitt: Impfung gegen humane Papillomaviren).

Diese Woche

31/2007

Neuerungen in den aktuellen Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI/Stand: Juli 2007
Mitteilung der STIKO

Hinweise auf Publikationen und Veranstaltungen:

- ▶ Symposium aus Anlass der Verabschiedung von Prof. Dr. Dr. h.c. R. Kurth
- ▶ 3. Charité Trainingskurs für Innere Medizin
- ▶ 11. Koblenzer AIDS/Hepatitis-Forum
- ▶ Mainzer Hygiene- und Infektiologie-Tag

Meldepflichtige Infektionskrankheiten:

- ▶ **Monatsstatistik** nichtnamentlicher Meldungen des Nachweises ausgewählter Infektionen Mai 2007 (Stand: 1. August 2007)
- ▶ **Aktuelle Statistik** 28. Woche 2007 (Stand: 1. August 2007)

Dengue-Fieber:

Mehr Fälle aus der Dominikanischen Republik und von den Philippinen

25 A
4496
ZB MED 