

## KOMMENTAR

- In der Zukunft angekommen  
A. Diehm 247

## INTERVIEW

- Mittler zwischen Wissenschaft und Berufspolitik  
Nachgefragt bei Prof. Dr. med. H. Busse 248

## AKTUELL

- Zur aktuellen wirtschaftlichen Situation  
der Augenärzte – Beispiel Niedersachsen  
H.-J. Hellweg 236

- BVA erneut erfolgreich:  
Einstweilige Verfügung gegen ZVA  
U. Kraffel 240

- Im Osten viel Neues  
– Mangelversorgung wird eklatant  
U. Kraffel 242

- Update zur eCard  
U. Kraffel 245

- Mutterschutz à la Schmidt  
U. Kraffel 246

## VERTRAGSARZTTÄTIGKEIT

- Rabattverträge für Arzneimittel:  
Betrifft jetzt auch Augenärzte  
B. Bertram, S. Schneider 251

- „Einzig gangbarer Weg“  
Augenärztin hat ihre Kassenzulassung  
zurückgegeben  
Leserbrief von E. Schuster 252

- Achtung bei Formularbestellungen  
U. Kraffel 253

- Arzneimittel-Richtgrößen:  
Verschärfte Prüfungen  
B. Bertram 254

- Abrechnung: Können obligate Leistungsinhalte  
delegiert werden?  
A. Gutzeit 256

- Medizinische Versorgungszentren:  
Vorsicht beim Zulassungsverzicht  
U. Kraffel 259

## AUS DEN RESSORTS

- Gesetzliche Krankenversicherung:  
Verordnungsfähigkeit von Tränenersatz-  
mitteln präzisiert  
B. Bertram 260

- Raumausstattung bei Kleinchirurgie:  
Anforderungen bei Operationen nach §115 b SGB V  
U. Kraffel 260

Titelbild: Illustration Christine Ball, Heidelberg

## GEBÜHRENORDNUNG

- Die große EBM-Reform  
So gesehen von U. Kraffel 262

- Der „Euro“-EBM – eine Mogelpackung  
Anders gesehen von S. Schneider 265

- Postoperative Behandlung nach beleg-  
ärztlicher Operation: Abrechnungsnummern  
in Kapitel 31.4 gestrichen  
S. Schneider 264

## IGEL

- Glaukomfrüherkennung:  
Aktuelle BVA-Formulare verwenden  
R. Stiasny, B. Bertram 269

## QUALITÄTSMANAGEMENT

- Repräsentative Studie:  
Qualitätsmanagement lohnt sich offenbar  
S. Heusel 270

- Umsetzungshilfen für das interne  
Qualitätsmanagement  
Teil 11: Mitarbeiter und Fortbildung  
P. Heinz 271

## RECHT

- Akuter Sehverlust im Alter  
Erfahrungen aus einer Gutachterkommission  
Teil 1: Amaurosis fugax  
D. Friedburg 275

## UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

- Kostenmanagement in der Augenarztpraxis:  
Personalkosten  
O. Frielingsdorf 277

- Doch Fahrtenbuch führen?  
Bundesfinanzhof: 20-km-Regelung  
verfassungswidrig  
U. Kraffel 278

- Neue Abgeltungssteuer ab 2009:  
Kapitalerträge kosten weniger Geld  
Ch. Gante 279

- BVA: Vorsorgeordner erarbeitet  
U. Kraffel 281

- Die Risiken einer GmbH  
U. Kraffel 285

## REPORTAGE

- Als Augenarzt in Grönland  
M. Schellhorn 287

## RUBRIKEN

- Personalia 244  
Rezension 291  
Kongresse 293  
Industrienachrichten 295 - 300  
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen ab 301  
Niederlassungen und Vertretungen 304  
Impressum 244

OPHTAL



Tim<sup>®</sup>-O  
Das günstige  
Timolol

Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> / - sine

Runter mit  
dem Druck

... und zwar  
präzise!

Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> 0,1% bzw. 0,25% bzw. 0,5%, Augentropfen  
Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> 0,1% bzw. 0,25% bzw. 0,5% sine, Augentropfen  
Wirkstoff: Timololhydrogenmaleat (Ph. Eur.). Verschreibungspflichtig. Zusammen-  
setzung: 1 ml Lösung enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil: Timolol-  
hydrogenmaleat (Ph. Eur.) 1,37 mg / 3,42 mg / 6,83 mg (entspr. 1 mg / 2,5 mg /  
5 mg Timolol). Sonstige Bestandteile: Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahy-  
drat (Ph. Eur.), Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Wasser für Injektionszwecke.  
Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>, Augentropfen zusätzlich: Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel,  
bronchiale Hyperreagibilität, bestehendes oder anamnestisch bekanntes Bronchial-  
asthma, chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen, Sinusbradykardie, AV-Block  
zweiten und dritten Grades, dekompensierte Herzinsuffizienz, kardogener Schock,  
schwere allergische Rhinitis, dystrophische Störungen der Hornhaut). Bei Patienten mit  
Hirndurchblutungsstörungen und Muskelschwäche ist Vorsicht geboten. Es wurde von  
einer verstärkten Muskelschwäche im Sinne myasthenischer Symptome wie Doppelbil-  
der, hängende Lider und allgemeiner Schwäche berichtet. Unter der Behandlung können  
die Zeichen einer Hypoglykämie verschleiert sein. Schwangerschaft/Stillzeit: Da beim  
Menschen keine ausreichenden Erfahrungen über die Anwendung von Timolol in der  
Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, nur unter strengster Indikationsstellung  
anwenden. Frühgeborene und Kleinkinder: Nicht anwenden bei Früh- und Neugeborenen.  
Nebenwirkungen: Augen: Reizungserscheinungen an den Augen wie Konjunktivitis, Ble-  
pharitis, Keratitis sowie Sehstörungen, Diplopie, reduzierte Hornhautsensibilität, Ptosis  
und Trockenheitsgefühl der Augen. Endokrines System: Verdeckung der Symptome einer  
Hypoglykämie bei insulinabhängigen Diabetikern, Magen-Darm-Trakt: Übelkeit, Diarrhö,  
Nervensystem: Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, depressive Verstimmung,  
Verstärkung der Symptomatik einer Myasthenia gravis, Parästhesien. Systemische Ne-  
benwirkungen: Herz-Kreislauf-System: Bradykardie, Arrhythmie, Hypotomie, Synkope,  
AV-Block, zerebrovaskuläre Insuffizienz, zerebrale Ischämie, Herzinsuffizienz, Palpitationen,  
Schmerzen im Brustbereich, Herzstillstand, Respirationstrakt: Bronchospasmen (beson-  
dere bei Patienten mit vorbestehenden bronchospastischen Erkrankungen), respiratorische  
Insuffizienz, Dyspnoe. Haut: Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. lokalisierte  
und generalisierte Exantheme und Urtikaria. Hinweise: Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> sine, Augentropfen:  
Nehmen Sie Kontaktlinsen vor dem Einsetzen heraus und setzen Sie diese erst nach 15  
Min. wieder ein. Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>: Benzalkoniumchlorid kann Reizungen am Auge hervor-  
rufen und kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Dieses Arzneimittel kann  
die Schließmuskeln beeinflussen und das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die  
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder  
zum Ablesen ohne sicheren Halt beeinträchtigt wird. Dies gilt im verstärkten Maße im  
Zusammenwirken mit Alkoholen. Darreichungsform und Packungsgrößen: Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>  
0,1% / 0,25% / 0,5% Augentropfen 5 ml (N1) und 3 x 5 ml (N2) Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> 0,1% sine  
mit 60 und 120 Einzeldosis-Behältnissen (N2/N3), Tim<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> 0,25% / 0,5% sine, Au-  
gentropfen mit 30, 60 und 120 Einzeldosis-Behältnissen zu je 0,5 ml Lösung (N1 / N2 / N3),  
Stand: Januar 2007.  
DR. WINZER PHARMA GMBH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13591 Berlin