

# ZPA EXTRA

Inhalt 10/2007



Tim®-Ophtal® / - sine

Runter mit dem Druck

... und zwar präzise!

**Tim®-Ophtal® 0,1 % bzw. 0,25 % bzw. 0,5 %, Augentropfen, Tim®-Ophtal® 0,1 % bzw. 0,25 % bzw. 0,5 % sine, Augentropfen**  
 Wirkstoff: Timololhydrogenmaleat (Ph. Eur.). Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil: Timololhydrogenmaleat (Ph. Eur.) 1,37 mg / 3,42 mg / 6,83 mg (entspr. 1 mg / 2,5 mg / 5 mg Timolol). Sonstige Bestandteile: Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph. Eur.); Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat; Wasser für Injektionszwecke. Tim®-Ophtal®: Augentropfen zusätzlich: Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel). Anwendungsgebiete: Erhöhter Augeninnendruck (okulare Hypertension), Grüner Star (chronisches Weitwinkelglaukom), Grüner Star nach Linsenentfernung (Aphakieglaukom), Kindliches Glaukom, wenn andere therapeutische Maßnahmen nicht ausreichen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil des Präparates, bronchiale Hyperreagibilität, bestehendes oder anamnestisch bekanntes Bronchialasthma, chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen, Sinusbradykardie, AV-Block zweiten und dritten Grades, dekompensierte Herzinsuffizienz, kardiogener Schock, schwere allergische Rhinitis, dystrophische Störungen der Hornhaut. Bei Patienten mit Hirndurchblutungsstörungen und Muskelschwäche ist Vorsicht geboten. Es wurde von einer verstärkten Muskelschwäche im Sinne myasthenischer Symptome wie Doppelbilder, hängende Lider und allgemeiner Schwäche berichtet. Unter der Behandlung können die Zeichen einer Hypoglykämie verschleiert sein. Schwangerschaft/Stillzeit: Da beim Menschen keine ausreichenden Erfahrungen über die Anwendung von Timolol in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, nur unter strengster Indikationsstellung anwenden. Frühgeborene und Kleinkinder: Nicht anwenden bei Früh- und Neugeborenen. Nebenwirkungen: Augen: Reizungsscheinungen an den Augen wie Konjunktivitis, Blepharitis, Keratitis sowie Sehstörungen, Diplopie, reduzierte Hornhautsensibilität, Ptosis und Trockenheitsgefühl der Augen. Endokrines System: Verdeckung der Symptome einer Hypoglykämie bei insulinabhängigen Diabetikern. Magen-Darm Trakt: Übelkeit, Diarrhö. Nervensystem: Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, depressive Verstärkung, Verstärkung der Symptomatik einer Myasthenia gravis. Parästhesien Systemische Nebenwirkungen: Herz-Kreislauf-System: Bradykardie, Arrhythmie, Hypotomie, Synkopen, AV-Block, zerebrovaskulärer Insult, zerebrale Ischämie, Herzinsuffizienz, Palpitationen, Schmerzen im Brustbereich, Herzstillstand. Respirationstrakt: Bronchospasmen (besonders bei Patienten mit vorbestehenden bronchospastischen Erkrankungen), respiratorische Insuffizienz, Dyspnoe. Haut: Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. lokalisierte und generalisierte Exantheme und Urtikaria. Hinweise: Tim®-Ophtal® sine, Augentropfen: Nehmen Sie Kontaktlinsen vor dem Eintropfen heraus und setzen Sie diese erst nach 15 Min. wieder ein. Tim®-Ophtal®: Benzalkoniumchlorid kann Reizungen am Auge hervorrufen und kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Dieses Arzneimittel kann die Sehleistung beeinflussen und das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt beeinträchtigt wird. Dies gilt im verstärkten Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. Darreichungsform und Packungsgrößen: Tim®-Ophtal® 0,1%/0,25%/0,5%, Augentropfen 5ml (N1) und 3 x 5ml (N2). Tim®-Ophtal® 0,1% sine mit 60 und 120 Einzeldosis-Behältnissen (N2/N3), Tim®-Ophtal® 0,25%/0,5% sine, Augentropfen mit 30, 60 und 120 Einzeldosis-Behältnissen zu je 0,5 ml Lösung (N1/N2/N3). Stand: Januar 2007.  
 DR. WINZER PHARMA GMBH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin

## AKTUELL

### Kommentar

**Kluge Einsicht – NRW-Minister Laumann warnt vor KV-Zerschlagung**

R. Kaden 389

### Interview

**Der neue EBM – Ausweg oder Irrweg?**

Nachgefragt bei Dr. med. U. Kraffel 390

**Avastin-Anwendung am Auge:**

**In der Diskussion – auch vor Gericht** 393

**Rabattverträge beeinflussen Verordnung von Timolol- und Chromoglycinsäure-Präparaten** 396

### Interview

**Genosse Augenarzt**

Nachgefragt bei Dr. med. U. Oeverhaus 397

**Große Erfolge, globale Herausforderungen Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft feiert ihre ersten 150 Jahre**

R. D. Gerste 399

**DOG-Tagung: Preisverleihungen** 401

## TITELTHEMA

**Was den Star grau macht Die kortikale Katarakt ist ein mechanisch bedingtes Leiden**

R. D. Gerste, G. Kluxen 403

**Entwicklung der Augenlinse** 409

## CME-FORTBILDUNG

**Diagnostik und Therapie von Orbitatumoren**

Teil 2: Orbitatumoren im Erwachsenenalter

K. Pollack 411

**CME-Fragen zum Beitrag**

**Diagnostik und Therapie von Orbitatumoren – Teil 2** 425

## MEDIZINGESCHICHTE

**Charles Bonnet und die visuelle Halluzination**

R. D. Gerste 427

## NACHRICHTEN & NOTIZEN

**Fahrerlaubnisverordnung:**

**Neue Bestimmung** 394

**Preisausschreibung** 394

**Verteporfin: Zulassung geändert** 395

**Ambulantes Operieren:**

**Halle erhält Ermächtigung** 395

**Personalia** 402

## RUBRIKEN

**Sportophthalmologische Fragen** 430

**Buchbesprechung** 424

**Kongreßnotiz** 431

**Referate** 430, 432

**Kleinanzeigen** nach: 426

**Industrienachrichten** nach: 392, 426

**Impressum** 408