

| | | | | |
|--|-----|---------------------------------|---|-----|
| ilitation etzten. | 103 | G. H. Schlund | Intermediär wirkende Insulinpräparate <i>Intermediary acting insulin preparations</i> | 146 |
| tion of cranial | | T. Strowitzki | Estradiol- und Östrogenspiegel unter Desogestrel <i>Oestradiol and oestrogen profiles under desogestrel</i> | 170 |
| pie y | 127 | G. Jorch | Das neue Babykopfkissen – ein sinnvolles Hilfsmittel? <i>The new baby pillow – a sensible device?</i> | 185 |
| Gynäkologie | 149 | U. Tenter und P. A. Thürmann | Lokale Anwendung von Diclofenac im Kindesalter <i>Local use of diclofenac in children</i> | 186 |
| aecology | | S. Halbach | »Ausleiten« von Quecksilber <i>»Elimination« of quicksilver</i> | 189 |
| d in Nahrungs- menten? t and food. | 193 | G. Weiser und M. Kleinke | Muttermilch und Mikrowelle <i>Mother milk and microwave</i> | 191 |

ung (CME)

| | |
|-----------|-----|
| Testbogen | 13 |
| reas. | 15 |
| | 25 |
| 7 | 26 |
| | 141 |
| | 167 |
| | 175 |

| | |
|------------|----|
| Verwendung | 49 |
|------------|----|

n use

Arzneimittelnebenwirkungen aktuell

| | |
|---|-----|
| Risedronat – toxische Leberschädigung | 139 |
| Mirena – aktualisierte Risikoinformation | 140 |
| Tamsulosin – akute Atemnot | 147 |
| Rimonabant – erhöhtes Risiko bei Depressionen | 148 |
| Nelfinavir – Einrichtung zweier Patientenregister | 165 |
| Nitrofurantoin – Lungenfibrose | 166 |
| Desmopressin – Streichung der Indikation »primäre Enuresis nocturna« | 174 |
| Bevacizumab – erhöhtes thromboembolisches Risiko | 179 |
| Topiramamat – Anhidrose und Hyperthermie | 184 |

Rubrik International

| | |
|--|-----|
| Berichte von der Europäischen Arzneimittel- agentur (EMA) | 144 |
| Berichte aus Großbritannien | 172 |
| Bericht aus Frankreich | 172 |
| Bericht aus Australien | 173 |
| Berichte von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) | 180 |