



**Der ältere Patient**  
Mehr Lebensqualität im  
Alter – was der Urologe  
dazu beitragen kann,  
lesen Sie im Schwerpunkt

ab Seite 24

## Schwerpunkt: Der ältere Patient

### Prävention

- 24 Pro-Aging gegen Krebs?
- 26 Lebenserwartung: Mit 120 ist Schluss

### Hypogonadismus

- 29 Testosteron im Teufelskreis

### Erektile Dysfunktion

- 30 Sauerstoff für den Penis
- 35 ED-Therapie als Anti-Aging-Maßnahme verkaufen
- 36 Experten-Gespräch zur Therapieberatung

### Benignes Prostatasyndrom

- 32 BPS als neue Indikation entdeckt
- 34 PDE-5-Hemmer gut für die Prostata?

### ÄP-Service

- 37 Fachbücher, Patienten-Ratgeber, Internet-Tipps

**Urologie** Oberhausers Vis Die besten Ärzte

Home | NEU Forum | DocBook | Shop Apo | Archiv | Newsletter | RSS Feeds | Serv

AP-Website AP-News Medizin im Web Lexikon Suche med

**Für den Arzt**  
Zertifizierte Fortbildung  
Neurologischer  
Praxisführer  
WAPost  
Ärzte ohne Grenzen  
Medizin

**Prostatakarzinom: Beeinträchtigt höhere Strahlens  
sexuelle Funktion?**  
Neueste Entwicklungen der Strahlentherapie tendieren dahin, P  
höheren Dosen über kürzere Intervalle zu behandeln. Ob dies zu  
sexuellen Funktionsfähigkeit geht, haben amerikanische Forscher nun untersucht.  
» mehr

**DOI entspricht Hormontherapie für ältere Männer**  
Bislang bei Männern im Alter die Testosteronwerte, beeinflusst dies nicht nur die  
Sexualität, sondern begünstigt auch die Entstehung eines metabolischen  
Syndroms. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie befürwortet in diesen  
Fällen – nach umfassender ärztlicher Prüfung – eine Hormontherapie. » mehr

Beachten Sie bitte unsere neuen Online-CME-Angebote  
In unserer Fortbildungs-Publik steht Ihnen ein neues Angebot zur  
Verfügung: Thema "BPS im Operativen Therapie" Machen Sie mit uns!

Täglich aktuelle  
Meldungen unter  
[www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

# Ihre Wahl bei BPH!



**Alfuzosin HEXAL® 10 mg**  
Retardtabletten

Wirkstoff: Alfuzosin-Hydrochlorid

Urologikum



**Tamsulosin HEXAL® 0,4 mg retard**

Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Wirkstoff: Tamsulosin-Hydrochlorid

Urologikum



20 Hartkapseln N1

[www.urologie.hexal.de](http://www.urologie.hexal.de)

**NEU von HEXAL:**

**Alfuzosin HEXAL 10 mg**

bis **64%** Preisvorteil zu  
Uroxatral® uno\*

Arzneimittel  
Ihres Vertrauens



\* Alfuzosin HEXAL 10 mg OP 100 vs. Uroxatral® uno OP 100.  
Lauer-Taxe, Stand: 15.10.2007

**Alfuzosin HEXAL 10 mg Retardtabletten:** Wirkstoff: Alfuzosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Retardtbl. enth. 10 mg Alfuzosin-HCl, Hypermellose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.) (pflanzl.) Povidon K25. **Anwendungsgeb.** Behandl. der funktionellen Sympt. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz.** Überempf. geg. Inhaltsstoffe gleich; Einnahme v. and. Alpha1-Rezeptorenblockern, Leberinsuff. Kombi m. Dopamin-Rezeptoragonisten. **Nebenwirk.** Häufig: Müdigkeit, Benommenh., Kopfschmerzen, Übelk., Oberbauchbeschwerden, Asthenie. **Gelegentl.** Schläfrigkeit, Schwindel, Unwohlsein, gestörtes Sehvermögen, orthostat. Hypotonie, Synkopen, Tachyk., Pupillar. Rhinitis, Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenh., Hautausschlag, Pruritus, Harninkontinenz, Hitzewall., Ödeme, Brustschmerzen. **Sehr selten:** Verschlimm. od. Wiederauftreten einer Angina pectoris. **In Einzell.** Pruripismus, Ethyl. Lactose, Weiz. Einzell. u. Hartk. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. **Verschreibungs-pflichtig.** **Mat.-Nr.:** 3 303410 **Stand:** März 2006 HEXAL AG 83607 Holzkirchen <http://www.hexal.de>

**Tamsulosin HEXAL 0.4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung:** Wirkstoff: Tamsulosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetzung enth. 0,4 mg Tamsulosin-HCl, mikrokristall. Cellulose, Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumhydrogencarbonat, Polysorbat 80, Talkum, Triethylcitrat, Druckstoffe (Schellack, Eisen(II)-oxid (E 172), (3-Sn-Phosphat)oxydianhydrid, Spig. Antischäummittel D0 1510, Farbst. E 132, E 171, E 172. **Anwendungsgeb.** Behandl. v. Sympt. des benignen Harntraktes b. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz.** Überempf. geg. Inhaltsstoffe (verschiebl. arzneimittelinduziertes Angiodödem), anamnestisch bekannte orthostat. Hypotonie, schwere Leberinsuff. **Nebenwirk.** Häufig: Schwindel. **Gelegentl.** Kopfschmerzen, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urtikaria, anormale Ejakulation, Asthenie, Salzen, Synkope, Angiodödem. **Sehr selten:** Pruripismus, Weiz. Einzell. u. Gebrauchsinfo. **Verschreibungs-pflichtig.** **Mat.-Nr.:** 3 303410 **Stand:** Januar 2006 HEXAL AG 83607 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>

Fotos: KES/Plewig, Stadt Berlin, Archiv/Rose, CARO Titelbild: CARO (5), Bilderbox