

IN|FO|NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE

interdisziplinäre Fortbildung in der Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

EDITORIAL

- 1 Zweite Runde in der Exzellenzinitiative**
Neurowissenschaften diesmal noch besser vertreten
K. Lieb, Mainz

JOURNAL SCREEN

- 6 Essstörung**
Jugendliche mit Bulimia nervosa: Therapeutisch geleitete Selbsthilfe ist wirksamer als Familientherapie
B. Herpertz-Dahlmann, Aachen
- 8 Neurodegenerative Erkrankungen**
Gentherapie beim Morbus Parkinson. Konkrete Hoffnungen sind verfrüht
F. Steigerwald, G. Deutschl, Kiel
- 10 Vestibulopathie**
Ursachen und Epidemiologie der bilateralen Vestibulopathie.
D. Timmann-Braun, Essen
- 12 Autoimmunkrankheiten**
Autoimmune limbische Enzephalitis. Membranständige Autoantikörper verraten die Prognose
B. Storch-Hagenlocher, Heidelberg
- 14 Schizophrenie**
CATIE-Studie revisited: Atypikum oder Typikum? Beim Einfluss auf die kognitive Leistung waren alle gleich
St. Wagner, A. Scheurich, Mainz
- 15 CATIE-Studie revisited – 2: ... auch bei der Lebensqualität keine Unterschiede**
D. Naber, Hamburg
- 16 Suizid**
Erhöhte Selbstmordgefahr bei Epilepsiepatienten. Die Diagnose „Epilepsie“ nimmt den Lebensmut
L. Tebartz van Elst, Freiburg i. Br.
- 18 Kopfschmerz**
Kurzzeitprophylaxe der menstruellen Migräne. Die Attacken werden nur verschoben
H.-C. Diener, Essen
- 20 Depression**
Behandlung komorbider Depression bei koronarer Herzerkrankung. Antidepressivum oder Psychotherapie?
L. Kriston, M. Härter, Freiburg i. Br.
- 21 M. Parkinson**
Apomorphin beim fortgeschrittenen Parkinson-Syndrom. Subkutane Bolus-Therapie holt die Patienten aus der Starre
D. Dressler, Rostock
- 22 Bipolare Störungen**
Atypische Antipsychotika bei manischen Episoden. Differenzierter Einsatz sinnvoll?
J. Langosch, Freiburg i. Br.
- 24 Multiple Sklerose**
Kernspintomografisch nicht erfassbare Läsionen in der Hirnrinde. Schuld für Leistungseinbußen bei Multipler Sklerose?
H. Ch. Hopf, Mainz
- 25 Schmerztherapie**
Chronische lumbosakrale radikuläre Schmerzen. Morphin oder Trizyklika nicht wirksamer als Placebo?
H.-C. Diener, Essen
- 26 Epilepsie**
Monotherapie fokaler Epilepsien. Der „Newcomer“ erweist sich dem „Klassiker“ als ebenbürtig
J. Bauer, Bonn
- 28 Sekundärprävention**
Nach erstem vaskulären Ereignis: Plättchenhemmer schützen im Duett wirksamer als solo
H.-C. Diener, Essen
- 29 PTSD**
Verhaltenstherapeutische oder gegenwartsbezogene Therapie. Was hilft traumatisierten Frauen?
J. Müller, Zürich
- 30 Parkinson**
Neuer Dopaminagonist als Pflaster. Wirksam und verträglich bei der Parkinsonkrankheit im frühen ...
... und im späten Stadium
V. Ries, W. H. Oertel, Marburg
- 32 Demenz**
Höhere spontane Zytokinproduktion: Ein Risiko für die Alzheimerdemenz?
M. Hüll, Freiburg i. Br.



Titelbild: Getty Images

Beilage

Medizin Forum:
Alzheimer-Demenz.
Memantine: Anderes Wirkprinzip – verbesserte Wirksamkeit