Der Urologe

Band 46 • Heft 12 • Dezember 2007

Leserservice:

Mit den SpringerAlerts immer auf dem neuesten Stand

Möchten Sie per E-Mail informiert werden, sobald neue Ausgaben von Zeitschriften Ihrer Wahl erschienen sind?

Registrieren Sie sich hierzu kostenlos bei den SpringerAlerts auf springer.de – Sie erhalten dann regelmäßig Inhaltsverzeichnisse der neuesten Zeitschriftenausgaben und Buchreihen sowie Informationen über neue Bücher.

Dieser Service ist kostenlos, schnell und vor allem flexibel. Sie können die SpringerAlerts genau an Ihre Interessen und Ihren Bedarf anpassen, um nur die Informationen zu erhalten, die Sie wirklich benötigen.

Anmeldung und weitere Informationen:
springer.de

Originalien Originals

C. van der Horst · C.M. Naumann · S.K. Wilson · B. Wefer · P.M. Braun · K.P. Jünemann
Korrektur der Fehlfunktionen von artefiziellen Sphinkterimplantaten (AMS 800®) über einen transskrotalen Zugang. Optimiertes Vorgehen anhand von Patientenbeispielen 1704
Dysfunctions of artificial urinary sphincters (AMS 800®) and their management via a transscrotal access. Optimimum procedure illustrated by reference to clinical examples

M. Heuser · B. Hemmerlein · M. Püsken · N. Koskinas · C. Dullin
A.J. Gross · G.M. Zöller · S. Obenauer
Die Erfassung der Progression des Nierenzellkarzinoms in Kleintieren mittels Flachdetektor-Volumen-CT 1710
Determination of renal carcinoma progression in small animals by means of flat-panel volumetric computer tomography

Kasuistiken Case reports

C. Lenggenhager · T. Warzinek · R.P. Wüthrich · J. Müller · H.-P. Schmid · D.S. Engeler
Laserbehandlung bei nicht-parasitärer Chylurie 1715
Nonparasitic chyluria treated by laser

B. Kazarians · I. Kausch · A. Meyer · S. Krüger · C. Doehn · D. Jocham
Lokalisierte Amyloidose des Harnleiters 1718
Localized amyloidosis of the ureter

CME Weiterbildung • Zertifizierte Fortbildung Continuing education

C. Wicke · D. Schilling · S. Feyerabend · A. Königsrainer · A. Stenzl
Pathophysiologie der Wundheilung und modernes Wundmanagement im urologischen Kontext 1721
Pathophysiology of wound healing and current treatment strategies in a urological context

CME-Fragebogen 1733
Questionnaire

Mitteilungen Society news

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Urologie 1735
Bulletin of the German Society for Urology

Berufspolitische Informationen Political information and profession

URO-Telegramm · URO-telegramm 1746

Berufsverband der Deutschen Urologen 1747
German Association of Urologists

Berufsverband der Österreichischen Urologen 1755
Austrian Association of Urologists

Verschiedenes Miscellaneous

Fachnachrichten · News 1646, 1663, 1669, 1675

Termine · Forthcoming meetings 1764

Vorschau auf Heft 1 • Januar 2008
Änderungen vorbehalten

Die Entwicklung der Harnableitungen

Redaktion: R. Hautmann

- **Von Hart zu Seifert zu Bricker**
- **Die Entwicklung der Harnableitung in nicht ausgeschaltete Darmsegmente**
- **Kontinente Stuhlreservoire - eine chirurgische Herausforderung**
- **Weiterentwicklung kontinenter Reservoire**
- **Ileale Ersatzblase**
- **Perspektiven der Harnableitung - was bleibt?**

Finasterid HEXAL® 5 mg Filmtabletten: Wirkstoff: Finasterid. **Zusammensetz.:** 1 Filmtbl. enth. 5 mg Finasterid, Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), mikrokrist. Cellulose, Lactose, Magnesiumstearat, Hypromellose, Talkum, Titandioxid, Eisenoxid gelb. **Indikation:** Behandlung des Prostatakarzinoms bei Patienten mit Risiko einer akuten Harnretention u. die Notwendigk. eines chirurg. Eingriffs zu vermind. Finasterid HEXAL® 5 mg Filmtbl. sollte b. Pat. m. einer vergröß. Prostata (Prostatavolumen über ca. 40 ml) zu verbessern sowie das Risiko einer akuten Harnretention u. die Notwendigk. eines chirurg. Eingriffs zu vermind. **Finasterid HEXAL® 5 mg Filmtabletten: Wirkstoff:** Finasterid. **Zusammensetz.:** 1 Filmtbl. enth. 5 mg Finasterid, Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), mikrokrist. Cellulose, Lactose, Magnesiumstearat, Hypromellose, Talkum, Titandioxid, Eisenoxid gelb. **Indikation:** Behandlung des Prostatakarzinoms bei Patienten mit Risiko einer akuten Harnretention u. die Notwendigk. eines chirurg. Eingriffs zu vermind. Finasterid HEXAL® 5 mg Filmtbl. sollte b. Pat. m. einer vergröß. Prostata (Prostatavolumen über ca. 40 ml) zu verbessern sowie das Risiko einer akuten Harnretention u. die Notwendigk. eines chirurg. Eingriffs zu vermind.