


Inkontinenz



Auch bei Patientinnen mit neurologischen Störungen kann durch Pflegemaßnahmen Kontinenz erreicht werden.

Seite 12

M. Schöny-Heindl, Wien


Harnwegsinfekt

Die Detektion von Dysfunctional Voiding bei rezidivierendem HWI kann durch komparative Urodynamik deutlich verbessert werden.

Seite 14

T. Akkad, Innsbruck

Nierentumor



Eine laparoskopische Nierentumorsektion kann verglichen mit offener Vorgangsweise durchaus gleichwertige Ergebnisse bringen.

Seite 34

K. Jeschke, Klagenfurt

INKONTINENZ

- 08 MKÖ-Jahrestagung
Der geriatrische Patient und die Mischinkontinenz
- 10 AMS 800™
Referenzmethode bei der komplexen Inkontinenz des Mannes
- 12 MKÖ-Jahrestagung: Aus der Sicht der Pflege
Die Dranginkontinenz beim neurologischen Patienten

INFEKTION

- 14 Rezidivierender Harnwegsinfekt bei Frauen
Komparative Urodynamik zur Diagnose von Dysfunctional Voiding


ONKOLOGIE

- 18 Prostatakrebs
Hormonbehandlung gewinnt an Bedeutung
- 20 DGU 2007
Prostatakarzinom und Nierenzellkarzinom
- 22 Takeda Urocyclicum 2007
Intensive Fortbildung zum Prostatakarzinom
- 26 DGU 2007
Strategien bei ossären Metastasen
- 28 Generika
Wie gleich ist gleich?
- 30 11. Urologisches Herbstsymposium
Neues zum Prostatakarzinom
- 32 Blasenkarzinom
Fluoreszenzdiagnostik verbessert Detektion
- 33 DGU 2007: Nierenzellkarzinom
Sunitinib: Optimale Therapie mit überzeugenden Daten
- 34 Laparoskopische Nierentumorsektion
Der positive Schnittrand

KINDERUROLOGIE

- 36 Kinderurologie
Modernes Management der kindlichen Nephrolithiasis

termin



Fachinformation zu Inserat auf Seite 52