


Comprehensive-Cancer-Center (CCC)
(Forschungsaktivität)

↑
Vernetzung von onkologischen Zentren (CC)
Anschluss mehrerer Organ-Einheiten

↑
Vernetzung von Organisationen (C)
Anschluss zur einzelnen Organe

Stufenmodell der onkologi-
schen Versorgungsstrukturen

381




Lokalrezidivrate (IBTR – in-
Brust-Tumorrezidive) bei inva-
siven und nicht-invasiven Mammatumoren

387

Situs nach systematischer para-
aortaler und pelviner Lymphono-
dektomie beim frühen Ovarialkarzinom

397



Änderung der Lebereisenkon-
zentration (LIC) bei MDS unter
verschiedenen Dosierungen von Deferasirox

419

NEWS

- 378** Temsirolimus (Torisel®) zur Erstlinien-Therapie des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms zugelassen...Nilotinib (Tasigna®) erhält in der EU die Zulassung für die Zweitlinien-Therapie von CML-Patienten...EU-Zulassung von Panitumumab (Vectibix®) zur Therapie des metastasierten Kolorektalen Karzinoms vom KRAS-Wildtyp...Docetaxel (Taxotere®) erhält Zulassungserweiterung zur Induktionstherapie bei operablen Kopf-Hals-Tumoren
- 380** ASH (American Society of Hematology) 2007: Dasatinib (Sprycel®) bei Imatinib-resistenter CML – Follow-up-Daten der Studie START-C...PRI Peptid-Vakzine verlängert ereignisfreies Überleben bei verschiedenen Formen der myeloischen Leukämie...Imatinib (Glivec®) kombiniert mit Hochdosismethotherapie verlängert ereignisfreies Überleben von Kindern mit Ph+ - ALL...Fortgeschrittenes follikuläres Lymphom: (90Y)-Ibritumomab-Tiuxetan (Zevalin®) verlängert Überleben...Hohe Rate an Langzeitüberlebenden mit Mantelzell-Lymphom nach intensiver Immunchemotherapie...Multiples Myelom: Höhere 1-Jahresüberlebensraten mit Lenalidomid plus niedrig dosiertem Dexamethason als unter dem Hochdosismethotherapie

GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE

- 381-382** Zentrumsbildung in der Onkologie. Olaf Ortmann, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universität Regensburg.
- 383-384** Vorabinformation zur aktualisierten Stufe-3-Leitlinie. Ute Albert, Klinik für Gynäkologie, gynäkologische Endokrinologie und Onkologie, Marburg.
- 386-390** Strahlentherapie beim Duktalen Carcinoma in situ (DCIS). Frederik Wenz, Klinik für Strahlentherapie & Radioonkologie, Universitätsklinikum Mannheim.
- 391-395** Interdisziplinäre S2k-Leitlinie für die Diagnostik und Therapie maligner Ovarialtumoren. Barbara Schmalfeldt, Frauenklinik der Technischen Universität München.
- 396-407** Operative Therapie der Patientin mit Ovarialkarzinom. Barbara Schmalfeldt, Frauenklinik der Technischen Universität München

KONGRESSBERICHTE

- 408** Zervixkarzinom: HPV-Impfstoff Cervarix® in Deutschland zugelassen
- 410** Metastasiertes Mammakarzinom: Günstiger therapeutischer Index von Gemcitabin-Regimen
- 411-414** Supportivtherapie: Lebensqualität optimieren – Supportive Lücken schließen...Onkologisch tätige Ärzte und Apotheker wollen klinische Probleme gemeinsam meistern...Aktuelle Daten zur Therapie schwerer Infektionen bei hämato-onkologischen Patienten...Methylnaltrexon vermindert Opioid-induzierte Obstipation
- 414** Multiples Myelom: Bortezomib auch bei niereninsuffizienten Myelompatienten effektiv und verträglich
- 415** Metastasiertes Kolonkarzinom: Vielzahl von Optionen ermöglicht individualisierte Therapie...Cetuximab verlängert Gesamtüberleben beim mCRC
- 416** Prostatakarzinom: Stellenwert der Docetaxel-basierten Chemotherapie des metastasierten hormonrefraktären Prostatakarzinoms
- 417** Barrett-Ösophagus: Klinisches Management mit vielen offenen Fragen

PHARMAFORUM

- 418-419** Regelmäßige Bluttransfusionen: Einfache und sichere Therapie der Eisenintoxikation mit Deferasirox (Exjade®)
- 420** Orale Analgesie über 24 Stunden mit osmotisch aktivem Hydromorphon

422 NACHRICHTEN