

## INHALT

### HERAUSFORDERUNG: SCHLAGANFALL IM ALTER

- Schlaganfallpatienten: Rehabilitation und Langzeitbetreuung** 26  
*Johann Donis, Wien*

### SCHLAGANFALL: AKUTTHERAPIE UND SEKUNDÄRPRÄVENTION

- Konzept einer geriatrischen Schlaganfalleinheit** 31  
*Roland Hardt, Mainz*

### UROLOGIE: DER ICI ALGORITHMUS

- Management der Harninkontinenz im höheren Alter** 36  
*Helmuth Madersbacher, Innsbruck*

### GERIATRIE JOURNAL – SPEZIAL

- Geriatrische Rehabilitation nach dem GKV-WSG:  
Reha auch bei Demenz-Patienten** 39  
*Martin Bischoff, Planegg*

### PHARMA: SYMPOSIEN & PRAXISINFORMATIONEN

- PDE-5-Hemmer: Pharmakologische Unterschiede  
beeinflussen Patientenpräferenz** 40
- Analgesie: Morphin nicht der Goldstandard** 40
- Alzheimer Demenz: Dualer AChE-Hemmer verzögert Krankheitsverlauf** 41
- Hypertonie: Kombinationstherapie für hypertonen Diabetiker  
bessere Wahl** 42
- Akutschmerzen: Postoperative Schmerzen mit Oxycodon therapieren** 42


### DIVERSES

- Termine/Impressum** 43



Foto: AOK

*Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern, rund ein Fünftel der über 65-jährigen ist davon betroffen – mit steigender Tendenz. Mit der Erkrankung befassen sich die Beiträge „Rehabilitation und Langzeitbetreuung“ und „Konzept einer geriatrischen Schlaganfalleinheit“ ab Seite **26***



*Inkontinenz zählt nach wie vor zu den häufigsten Gründen für die Einweisung in Alten- und Pflegeheime. Die Ursache der Harninkontinenz im Alter ist meist multifaktoriell und kann außerhalb des Harntraktes liegen. Hinweise zur Ursachenforschung und Therapie ab Seite **36***

### Titelbild

© Marti Timple – Fotolia