



Pubertät
 Mit etwa 13 erleben Mädchen zum ersten Mal ihre Menstruation. Tritt dieser Zeitpunkt deutlich früher ein, ist der Gynäkologe gefordert. Mehr dazu

ab Seite **22**

Schwerpunkt „Die junge Patientin“

Pubertas praecox

22 Wie früh ist zu früh?

Kontrazeption

30 Geistig behindert – wie verhüten?

35 Epilepsie: Medikamenten-Interaktionen beachten

Zum ersten Mal beim Gynäkologen

36 Wie Sie Schamgefühle geschickt unterlaufen

Teenager-Schwangerschaften

37 **Interview:** Was Frauenärzte vorbeugend tun können

38 **CME-Fragebogen**

Firmen-Beilagen:

Gyn-Telegramm

www.gyn-pro.org: Das Portal von und für niedergelassene Gynäkologen

Gynäkologie Oberhausers V...
 ab sofort wieder

Home | Forum | DocBook | Shop Mo | Archiv | Newsletter | FSS-Feets | Service

AP-Website | AP-News | Medizin im Web | Lexikon | Suche

Für den Arzt
 Zertifizierte Fortbildung
 Newsticker
 Praxisticker
 WAPcast
 Ärzte ohne Grenzen

Medizin
Koffein erhöht Fehlgeburts-Risiko
 Auf den Zusammenhang zwischen Koffein der Schwangerschaft und dem erhöhten Fehlgeburts-Risiko wird seit längerem hingewiesen unabhängig von Übelkeit und Erbrechen

Täglich aktuelle Meldungen unter
www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Pivello/Joakant, Archiv/Rose, Bilderbox/Montage: RBI, A1PIX
 Titelfbild: A1PIX

NEU!

Das erste Generikum zu Leios® / Miranova®

Minisiston® 20 fem

Eine Marke von Jenapharm

Nutzen Sie den Preisvorteil!

Bis zu **15%!**