


# ÄRZTE ZEITUNG



DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE


DONNERSTAG 28. FEBRUAR 2008



## Zweite Chance für Hepatitis-C-Kranke

Eine erste Therapie mit Interferon ist bei Hepatitis C oft nicht erfolgreich. Jeder vierte Betroffene kann aber mit einer Re-Therapie doch noch geheilt werden.

MEDIZIN 13



## Hausärzte resigniert, Patienten erbost

Gerade wenn es um Arzneitherapie geht, bekommen Hausärzte oft den Frust der Patienten ab. Und dürfen so den Sündenbock spielen für die Gesundheitspolitik.

WIRTSCHAFT 15

### TIPP DES TAGES

## Wann Antibiotika ins Reisegepäck gehören

Eine Antibiotika-Prophylaxe gegen Reisediarrhoe wird bei entsprechenden Auslandsreisen nur für bestimmte Hochrisiko-Patienten empfohlen: dazu gehören Patienten mit HIV-Infektion, mit aktiven chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus und mit fortgeschrittenen kardialen Erkrankungen. Empfehlenswert sei eine Antibiotika-Prophylaxe allerdings auch für Patienten, die Protonenpumpenhemmer einnehmen, rät ein Kollege. Denn diese Patienten hätten durch den Wegfall der Magensäure als natürliche Barriere ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit Salmonellen und anderen enteropathogenen Erregern. Empfehlenswert seien 2 x 500 mg/Tag Ciprofloxacin. (Quelle: www.medizin-online.de/plexus)

# Gesund leben plus Screening die Formel gegen Darmkrebs

Experten empfehlen, Vorsorge-Untersuchungen für Raucher voranzutreiben

NEU-ISENBURG (ars). Prävention ist ein wichtiges Thema, etwa im Darmkrebsmonat März. Gesichert ist der Nutzen von Stuhltests und Vorsorge-Koloskopien. Wenn Patienten noch mehr tun wollen, empfiehlt sich ein gesunder Lebensstil mit Rauchverzicht.

## Darmkrebsmonat März

2008

Zigarettenkonsum beschleunigt einer US-Studie zufolge die Manifestation von Darmkrebs: Raucher

## Raucher kriegen sieben Jahre früher

Rauchen schadet nicht nur der Lunge, sondern auch dem Darm

**64** Jahre

Durchschnittsalter, in dem Nichtraucher an Darmkrebs erkranken

**57** Jahre

Durchschnittsalter, in dem Raucher an Darmkrebs erkranken

