



W. Hörtl, Wien

## Prostatabiopsie

Eine gute Prostatabiopsie sollte heute mindestens 8 Stanzungen umfassen und stärker lateral durchgeführt werden als bisher.

## PSA als Biomarker


Nach wie vor ist der PSA-Wert das entscheidende Kriterium zur Indikationsstellung einer Biopsie und in der Nachsorge.



© BilderBox.com

## ESSM 2007

Praxisrelevante urologische Themen, aber auch Theoretisches und Molekularbiologisches waren in Lissabon stark vertreten.



© Walter Rehner

## Bladder Pain Syndrome

BPS heißt das Kürzel seit 2006 für die interstitielle Zystitis – ein Name, der das Krankheitsbild besser als bisher beschreibt.



C. Riedl, Baden

## COVERSTORY

KH Hietzing: Therapie des lokalisierten PCa  
Erste Erfahrungen mit HIFU als alternative Behandlung

## ÖGU-FORTBILDUNGSTAGUNG

ÖGU-Fortbildungstagung  
Neue Leitlinie zur Prostatabiopsie

ÖGU-Fortbildungstagung  
PSA: der zentrale Biomarker

ÖGU-Fortbildungstagung  
Neues zum Blasenkarzinom

Greenlight-Laser auf der ÖGU-Tagung  
Die Prostata schonend vaporisieren

## ESSM 2007

ESSM 2007: Urologie in der Herzinfarktprävention  
Erektile Dysfunktion – deutliches Warnsignal vor KHK

ESSM 2007  
Pikantes zum vinho verde

## BEITRÄGE

Bladder Pain Syndrome/interstitielle Zystitis

Fortgeschrittenes PCa in der urologischen Praxis  
Ergebnisse einer Erhebung in Österreich

Erektile Dysfunktion nach Prostatakarzinomtherapie

Onkologische Wintergespräche  
State of the Art beim Prostatakarzinom

Beherrschbare Prostata  
Pro Uro kommt an – und geht weiter

Nierenzellkarzinom  
Selektive VEGF-Hemmung als neues Therapieprinzip bei RCC

Fortbildung  
Therapie der überaktiven Blase

## MEDIZINGESCHICHTE

Geschichtlicher Rückblick: 1927–2007  
80 Jahre Abteilung für Urologie am AKH-Linz