

	<b>K.-J. Neumärker</b>	
	Karl Leonhard	327
	<i>Karl Leonhard</i>	
	<b>K. Rettig, C. Trenkwalder, K. Berger</b>	
	Die Häufigkeit des Restless Legs Syndroms in der primärärztlichen Versorgung	334
	<i>Prevalence of restless legs syndrome in primary care</i>	
<b>Geist &amp; Gehirn – Mind &amp; Brain</b>	<b>M. Spitzer</b>	
	Freiheit – eine gute Idee!	339
<b>Verbandsnachrichten</b>	Mitteilungen der DGM	342
<b>Verschiedenes</b>	Leserbrief	345
	Internationale Literatur	346
	Selbsthilfegruppen	348
	Buchbesprechungen	349
	Forum Alzheimer & Depression	351
	Interview	355
	Spotlight Alzheimer	356
	Aus Forschung und Industrie	357
	Termine	368
<b>Titelbild</b>	Physiotherapie: Alltägliche Bewegungsmuster wie z. B. das Aufstehen von einem Stuhl werden therapeutisch angeleitet unter Vermeidung pathologischer Tonusstörungen angebahnt und so in ihrer Bewegungsfunktion optimiert. (Quelle: T. Renkawitz, Bad Abbach)	