



Herzinfarkt-Mortalität

Dass die Herzinfarkt-Mortalität in Deutschland zweieinhalb mal höher als in Frankreich ist, zeigt eine aktuelle Auswertung deutscher Wissenschaftler von Daten des Jahres 2000 aus Statistikämtern europäischer Länder, in denen Todesfälle durch Herzinfarkt oder Schlaganfall bei Menschen im Alter von 45 bis 74 Jahren erfasst wurden.

6

Therapie des Typ-2-Diabetes

Nachdem kürzlich die große ACCORD-Studie zur Prognose von Typ-2-Diabetikern aufgrund erhöhter Mortalität in der Gruppe mit intensiverer Therapie vorzeitig abgebrochen wurde, profitierten Diabetiker in der fast gleichzeitig publizierten dänischen Steno-2-Studie durchaus von einer solchen intensiven Betreuung.

14

KARDIOLOGISCHE NOTFÄLLE

Während des „Sommermärchens“ der Fußball-WM in Deutschland im Jahr 2006 häuften sich immer dann die kardialen Notfälle, wenn die deutsche Mannschaft spielte.

KARDIOVASKULÄRES RISIKO

Stress am Arbeitsplatz fördert die Entstehung einer KHK – in gleichem Maße begünstigt durch einen ungesunden Lebensstil als auch durch direkte Stresswirkungen auf neuroendokrine Regelkreise.

HERZINFARKT UND SCHLAGANFALL

Deutsche Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Proteine Talin-1 und Kindlin-3 mögliche Zielmoleküle für die Entwicklung neuer Medikamente gegen Herzinfarkt oder Schlaganfall sein könnten.

VORHOFFLIMMERN

Neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Statinen in der Sekundärprävention liefert eine aktuelle Metaanalyse.

LITERATUR

Ein kleiner Überblick zu Veröffentlichungen in der Kardiologie

INTERVENTIONELLE KARDIOLOGIE

Bei Mehrgefäßerkrankungen scheinen nach den Daten zweier Patientenregister Vorteile für die Bypass-Op gegenüber der Stentimplantation und von DES vs. BMS zu bestehen.

6

10

AKUTER MYOKARDINFARKT

Die Thrombusaspiration scheint die Ergebnisse der PCI weiter verbessern zu können.

7

10

ARTERIELLE VERSCHLUSSKRANKHEIT

Deutliche Fortschritte zeichnen sich für Patienten mit pAVK ab: Ein mit Paclitaxel beschichteter Ballonkatheter senkt die Rate von Restenosen nach einer Angioplastie der Beinarterien.

8

12

HERZINFARKT & TYP-2-DIABETES

Eine Therapie mit Statinen kann bei Diabetikern ein Drittel aller Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern.

8

15

HYPERCHOLESTERINÄMIE

ENHANCE-Studie schlägt hohe Wellen

9, 11, 13

15

PHARMANEWS

Aktuelle Meldungen aus der Pharmaindustrie

17