




NSCLC: Typische subcarinale Lymphknotenmetastasierung im CT

357



NSCLC: Typische subcarinale Lymphknotenmetastasierung im PET/CT

357



MDS-Hochrisikopatienten: Gesamtüberleben unter 5-Azacytidin versus konventioneller Therapie

369

NEWS

338-344 33. Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO): Nichtkleinzelliges Bronchiakarzinom: Neue Daten zu zielgerichteter Therapie mit Erlotinib und Bevacizumab....Asiatische Studie bestätigt Vorteile von Gefitinib für Nichtraucher mit kleinzelligem Lungenkrebs....NSCLC: Anti-IGF-Antikörper wirksam in Kombination mit Chemotherapie....Metastasierter Brustkrebs: Erhaltungstherapie mit pegyliertem liposomalem Doxorubicin verlängert progressionsfreies Überleben....RANKL-Inhibitor Denosumab normalisiert Knochen-Resorptionsmarker besser als Bisphosphonate....Kein Hand-Fuss-Syndrom unter Behandlung mit Tegafur Uracil....Aktuelle Daten mit Cetuximab beim nichtkleinzelligen Bronchiakarzinom, Kopf-Hals-Tumoren und kolorektalem Karzinom....Update der RECORD-1-Studie: mTOR-Inhibitor RAD001 verlängert bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkrebs Zeit ohne Tumorwachstum um fast 5 Monate

LUNGENKREBS

345-348 Stellenwert der Erhaltungstherapie in der palliativen Behandlung des nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC). Alexander Schmittel, Charité, Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Transfusionsmedizin, Berlin.

349-352 Das Lungenzellkarzinom des Nichtrauchers. Martin Sebastian, Berthold Fischer, Roland Buhl, III. Medizinische Klinik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Schwerpunkt Pneumologie.

353-356 Adjuvante/Neoadjuvante Therapie des nichtkleinzelligen Bronchiakarzinoms. Andreas Gröschel, Innere Medizin V, Schwerpunkt Pneumologie, Allergologie, Beatmungs- und Umweltmedizin, Homburg/Saar.

357-362 Chemotherapie des kleinzelligen Lungenkarzinoms. David Felix Heigener, Martin Reck, Onkologischer Schwerpunkt, Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie Krankenhaus Großhansdorf.

HÄMATOONKOLOGIE

363-364 Akute myeloische Leukämie: Einfluss der Therapiestrategien auf die Lebensqualität

365 Interview: Schwankungen im Level der Resterkrankung könnten bei CML-Patienten auf ein Complianceproblem hinweisen

366-369 Aktuelle Strategien in der Therapie der Myelodysplastischen Syndrome

KONGRESSBERICHTE

370-371 Interview: Antisense-Wirkstoff erweist sich beim Pankreaskarzinom als sicher und gut verträglich

372-373 Interview: Phase-III-Studie mit dem Krebs-Immuntherapeutikum MAGE-A3 bei NSCLC gestartet

374 NSCLC: Sorafenib als Monotherapie verlängert signifikant das progressionsfreie Überleben stark vorbehandelter Patienten

375 Hochintensiv fokussierter Ultraschall (HIFU): Effektive Therapieoption beim lokalisierten Prostatakarzinom

376 Bortezomib in Europa für die Primärtherapie des multiplen Myeloms zugelassen... Lenalidomid/Dexamethason sehr wirksam bei verschiedenen Risikogruppen mit rezidiviertem/refraktärem multiplen Myelom

377 Mit Targeted Substanzen zur individualisierten Therapie

378 Therapiestrategien bei neutropenischen Patienten mit Fieber...Antiemese bei Chemotherapie: Aprepitant auch bei niedrig dosiertem Cisplatin von Nutzen

379 Brustkrebs: Letrozol schützt vor Rezidiven selbst nach längerer Therapiepause... Metastasierter HER2-negativer Brustkrebs: Randomisierte Studie prüft Docetaxel in Kombination mit Sorafenib

380 Bevacizumab wirkt unabhängig vom KRAS-Mutationsstatus beim metastasierenden kolorektalen Karzinoms

NACHRICHTEN

381-383 Therapeutischer Krebsimpfstoff wird an Melanompatienten untersucht.... Weichteilsarkom und Ovarialkarzinom: Rezidivtherapie mit Trabectedin verbessert Prognose....Oxaliplatin-haltige Chemotherapie: begleitende Schmerzmittelgabe empfohlen....Urintest warnt vor Komplikationen durch GvHD....Studien-Projekt: Inanspruchnahme des Mammographie-Screenings-Barrieren und erste Erfahrungen mit dem qualitätsgesicherten Screening