


34. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie

29. bis 31. Mai 2008, Bamberg, Kongresshalle

Abstracts von Vorträgen und Postern



Editorial	5
K. Weingärtner, N. Schmeller	
Donnerstag, 29. Mai 2008	
POSTERSITZUNGEN	
P1: Urolithiasis, Trauma, Kinderurologie (P1.1–1.11)	7
P2: Forschung, experimentelle Urologie (P2.1–2.14)	11
P3: Urothelzellkarzinom oberer Harntrakt (P3.1–3.8)	16
P4: Blasenkarzinom, Infektionen, Inkontinenz- und Prolapschirurgie (4.1–4.10)	18
P5: Niere und Nebenniere (5.1–5.15)	21
P6: BPH und Prostatakarzinom (6.1–6.18)	26
Freitag, 30. Mai 2008	
VORTRAGSSITZUNGEN	
V2: BPH, Prostatakarzinom: Epidemiologie, Diagnostik, Lymphadenektomie (V2.1–2.12)	32
V3: Niere/Nebenniere/Urothelzellkarzinom oberer Harntrakt (V3.1–3.13)	35
V5: Prostatakarzinom: Operative und adjuvante Therapie (V5.1–5.10)	40
V6: Äußeres Genitale, plastisch-rekonstruktive Eingriffe (V6.1–6.7)	43
V8: Harnblasenkarzinom (V8.1–8.9)	45
V10: Inkontinenz- und Prolapschirurgie II (10.1–10.12)	48
Samstag, 31. Mai 2008	
VORTRAGSSITZUNGEN	
V15: GeSRU Albtraum (V15.1–15.5)	54
Autorenindex	55
Impressum	5

Titelbild: Steinheilung Kaiser Heinrichs II., Rötelzeichnung von R. Klesse nach einem Relief von Tilman Riemenschneider am Kaisergrab im Dom zu Bamberg

Fachkurzinformation zur Anzeige auf der gegenüberliegenden Seite

TRENANTONE® Zweikammerspritze

Zusammensetzung: 1 Zweikammerspritze enthält 11,25 mg Leuprorelinacetat als 3-Monatsdepot. **Hilfsstoffe:** Retardmikrokapseln: Polymilchsäure, Mannitol. Suspensionsmittel: Carboxymethylcellulose-Natrium, Mannitol, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Bei Männern: Zur symptomatischen Therapie des fortgeschrittenen hormonabhängigen Prostatakarzinoms. Bei Frauen: Mammakarzinom prä- und perimenopausaler Frauen, bei denen eine endokrine Behandlung angezeigt ist. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Leuprorelin oder andere GnRH-Analoga, Polymilchsäure oder einen anderen Bestandteil des Präparates; intraarterielle Injektion. Nachgewiesene Hormonunabhängigkeit des Prostatakarzinoms. Bei Männern: chirurgische Kastration. Bei Frauen: Schwangerschaft und Stillzeit. **Pharmakologisch-therapeutische Gruppe:** GnRH-Analoga, ATC Code L02AE02. **Abgabe:** NR, Rezept- und apothekenpflichtig. **Packungsgröße:** 1 Zweikammerspritze. **Stand der Information:** Juli 2005. **Zulassungsinhaber:** Takeda Pharma GmbH, 1070 Wien, Seidengasse 33–35, Tel. 01/524 40 64, Fax: 01/524 40 66. **Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.**