

Steigerung der R0-Resektionsrate und Überlebensverlängerung durch Bevacizumab •

Schwerpunktartikel von PD Dr. med.

Karsten Ridwelski, Magdeburg. Bisher liegen publizierte Daten zu etwa 600 Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom vor, die mit kurativer Absicht eine Leberresektion erhielten. Die Daten beantworten folgende Fragen: In welchem Umfang steigert die zusätzliche Gabe von Bevacizumab zu einer Chemotherapie die R0-Resektionsrate? Haben Patienten, bei denen eine R0-Resektion möglich war, eine längere Überlebenszeit? Welchen Einfluss hat der K-RAS-Status auf die Anwendbarkeit von Bevacizumab?



Susanna Nishinaga/SPL/Agentur Focus

Seite 6 Ibandronat: Viele Vorteile bei Knochenmetastasen des Mammakarzinoms • Kongressbericht

Erlotinib: Adjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms • Die aktuelle Studie **Seite 7**



CNS/SPL/Agentur Focus

N016966-Studie und AVOREN-Studie • Internationale Literatur zu

Capecitabin und Bevacizumab

Primärtherapie follikulärer Lymphome – auf dem Weg zur Heilung? • Überblick **Seite 10**

Seite 12 Nationaler Krebsplan vorgestellt • Aktuelles

Titelbild:
Lebermetastasen.
Computertomographie.
Quelle: GCA/
SPL/Agentur Focus

