



Endokrinologie

Bartalena L et al.: Consensus statement of the European Group on Graves' Orbitopathy (EUGOGO) on management of GO. Eur J Endocrinol 158 (2008) 273-285

15

- Hausarzt wichtig ist 24
- Schlaganfall-Patienten: Rehabilitation nutzt allen 25
- Vestibulärer Schwindel: Cinnarizin plus Dimenhydrinat! 25

SCHMERZ

- Trophische Veränderungen: Sonderform des CRPS? 26
- Therapie starker Schmerzen: gut verträgliche Kombi 26
- Okzipital-Neuralgie operativ behoben 26

DEUTSCHER SCHMERZKONGRESS 2008, BERLIN

- Mit Leitlinien garantiert schmerzfrei? 28

ONKOLOGIE

- Prostatektomie: Salvage-Radiotherapie oder Beobachtung? 29
- NSCLC: verträgliche Chemotherapie mit Docetaxel 29
- ALL: Bedeutet Stresslyse eine gute Prognose? 29

NOTFALLMEDIZIN

- Posttraumatisches ARDS: Was die Prognose beeinflusst 30
- Stumpfes Thoraxtrauma: Erkennt das CT das Mortalitätsrisiko? 30

ARBEITSMEDIZIN

- Pneumonie durch Schimmel am Arbeitsplatz 36
- Holzstaub gefährdet vor allem Frauen-Lungen 36
- Welcher Beruf birgt ein hohes CTS-Risiko? 36

ARZT & PRÄVENTION

- Fokus 5
- Forschung und Entwicklung 20
- Site-Seeing Adipositas 14
- Steno 25
- Impressum 30
- CME Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen 37

Raum für Spekulationen

Prominente Köche wie *Alfons Schuhbeck* werden nicht müde, die antioxidativen Eigenschaften der Zutaten zu betonen, die sie für ihre Gerichte verwenden. Im Rahmen einer vielseitigen Ernährung ist gegen solche Ingredienzien nichts einzuwenden, wohl aber etwas gegen übertriebene Erwartungen. Solche waren in den 90er Jahren durch Studien geweckt worden, die z. B. der Supplementation von Selen eine Reduktion der Inzidenz von Prostatakarzinomen um 65% zuschrieben. Eben wurden zwei Megastudien publiziert, die für Selen und Vitamin C bzw. Vitamin E und C keinen solchen Effekt nachwiesen (JAMA vom 7.1.2009, S. 39 f. bzw. S. 52 f.)



Man kann davon ausgehen, dass diese Untersuchungen mit großer Sorgfalt konzipiert wurden. Dennoch irritiert es, dass in der mit Selen-Supplementation (SELECT) viel weniger Todesfälle durch Prostata-CA auftraten, als zu erwarten waren. Wahrscheinlich wurden mit Hilfe von PSA-Tests außerhalb der Studie viele Krebsfälle in frühem Stadium herausgefischt. So bleibt weiter Raum für Spekulationen, ob nicht doch ...

Dr. med. Wilfried Ehnert
 Chefredakteur
 ehner@gfi-online.de

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| A Anwendungsbeobachtung | M Metaanalyse |
| C Fall-Kontroll-Studie | R Randomisiert-kontrollierte Studie |
| F Fallbericht | S Sonstige Studienarten |
| K Kohortenstudie | U Übersicht |

© www.mauritius images