www.thieme-connect.de/ejournals/ www.thieme.de/zapik/angebote

Pneumologie

Zeitschrift für Lungenerkrankungen und Allergiepatienten

Februar 2009 · Seite 63 – 120 · 63. Jahrgang

2 · 2009

Pneumo-Fokus

63 Lungenembolie – Höhere Mortalität bei kürzerer Liegezeit

63 Asthma bronchiale – Blasmusik beugt Asthma vor

64 Arbeitsmedizin – Vermiculit: Pleurale und interstitielle Veränderungen schon bei geringer Exposition

64 Asthma und COPD – Inhalationstherapie weiter verbessern

65 Bronchialkarzinom – Niedrigdosis-CT zur Früherkennung?

66 COPD-Patienten mit Asthma bronchiale – Tiotropium verbessert Lungenfunktion

66 Bronchialkarzinom – Verbesserte Prognose durch Autofluoreszenz-Endoskopie?

Fallbericht | Case Report

67 Granulomatöse Bronchiolitis nach Aspiration von Lycopodium-Sporen bei einem Feuerspucker
Granulomatous Bronchiolitis due to Aspiration of Lycopodium Spores by Fire-Breathing
A. Morresi-Hauf, A. Neher, W. Wöckel, H. Kammler-Baumann

Originalarbeit | Original Paper

72 Herzfrequenzmessung zur Bestimmung der Trainingsintensität in Lungensportgruppen
Heart Rate Measurement for Determination of Training Intensity in Outpatient Pulmonary Sport Groups
H. J. Baumann, S. Kluge, H. Klose, A. Hellweger, M. Braumann, A. Meyer

Leserbrief | Letter to the Editor

78 Austausch von Inhalatoren in der Apotheke aufgrund des Rahmenvertrages vom 1.4.2008 und individuelle Rabattverträge
Substitution of Inhalation Devices in the Pharmacy According to a Frame Contract (Dated 1st April, 2008) and Individual Discount Regulations
T. Hausen

Originalarbeit | Original Paper

80 Spiroergometrie bei einem Patienten mit Sarkoidose II
Eine außergewöhnliche Kombination von Funktionsstörungen
Exercise Testing by Spiroergometry in a Patient with Sarcoidosis Stage II
An Unusual Combination of Functional Impairments
K. H. Rühle, K. J. Franke, S. Morgenstern, G. Nilius

Bronchiolozentrische epitheloidzellgranulomatöse Entzündung, S. 69.

hale® 12 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation: WIRKSTOFF: Formoterolfumarat-Dihydrat. **Zusammensetzung:** Eine Dosis enthält: 12 µg Formoterolfumarat-Dihydrat. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von Patienten mit Asthma bronchiale, die zusätzlich zu einer Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden auch einen langwirks. Beta2-Agonisten benötigen. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. **Nebenwirk.:** Häufig: Kopfschmerzen, Palpitationen, Tremor. Gelegentl.: Agitiertheit, Schwindel, Angst, Nervosität, Schlafstör., Tachyk., Muskelkrämpfe, Myalgie. Selt.: Hypokaliämie, Vorhofflimmern, supraventrikul. Tachyk., Extrasystolen, versch.