

Neue Arzneimittel

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler | Frankfurt/Main

Redaktion: Dr. Bettina Hellwig (verantwortlich)


ISSN 0724 - 567X | Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart

56. Jahrgang | Juli 2009 | 7

58 INHIBITOR DES NATRIUMIONEN-EINSTROMS ZUR BEHANDLUNG DER KHK

Ranolazin


Ranolazin (Ranexa®) wird zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit (KHK) eingesetzt, und zwar als Ergänzungstherapie zur symptomatischen Behandlung von Patienten mit stabiler Angina pectoris, deren bisherige Behandlung nicht ausreicht oder die antianginöse Mittel der ersten Wahl (wie Betablocker und/oder Calciumantagonisten) nicht tolerieren.



62 STOFFWECHSELKRANKHEITEN

Sapropterin

Sapropterin (Kuvan®) ist bei Erwachsenen und Kindern ab vier Jahren mit Phenylketonurie zur Behandlung der Hyperphenylalaninämie angezeigt, wenn diese nachweislich auf eine solche Therapie anspricht. Sapropterin ist ferner zur Behandlung einer Hyperphenylalaninämie bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit einem Tetrahydrobiopterin- (BH₄-)Mangel, die nachweislich auf eine solche Therapie ansprechen, indiziert.



UF I
Zs. 15
-Beit. zu 149, 27-
ZB MED