

ANGIOLOGIE

Erythromelalgie

selten, belastend und oft über Jahre verkannt. Anfallsartige Hyperperfusionszustände, meist an den Unterschenkeln und Füßen, lassen dieses Krankheitsbild zuverlässig diagnostizieren. Wichtig zu unterscheiden sind die primäre und die sekundäre Form, welche auf ernstesten Grunderkrankungen beruhen kann. Für die primäre (idiopathische) Form werden neue Forschungsergebnisse einer genetischen Ursache beschrieben.

M. Marshall, Chr. Schwahn-Schreiber

92

Zentralvenöse Stenosen und Thrombosen durch großlumige Langzeitkatheter

Besonderheiten bei Dialysepatienten

Bei zentralvenösen Thrombosen der oberen Extremitäten finden sich oft liegende zentralvenöse Katheter. Das Behandlungsspektrum umfasst Antikoagulation, Lyse und interventionelle Dilatationen.

Christoph P. Schröders, Leif Germaschewski, Tobias M. Steinke

96

Langzeitergebnisse nach venöser Thrombektomie bei iliofemoraler Thrombose

Im Fall von ausgedehnten tiefen Venenthrombosen mit Beteiligung der Beckenvenen stellt die venöse Thrombektomie nach Erfahrung der Autoren eine effektives Verfahren zur Rekanalisation der Bein- und Beckenvenen dar, welches auch langfristig die Ausbildung eines schweren postthrombotischen Syndroms verhindert.

Bruno Geier, Christopher Lindow, Giuseppe Ascianto, Barbara Strohmann, Thomas Hummel, Harald Freis, Achim Mumme

101

Die Erfrierung – ein wenig beachtetes Krankheitsbild

Durch Zunahme riskanter Freizeitaktivitäten steigt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens lokaler Kälteschäden. Hauptziel der Therapie ist der Gewebserhalt. Kernpunkte des Konzepts sind neben der raschen Erwärmung die Thrombolysen und die sterile Wundbehandlung.

Helga Schubert

106

PHLEBOLOGIE

Rezidivvarikosis nach Endovenöser Laser-Therapie (EVL) bei Patienten mit Insuffizienz der Vena saphena magna und der Vena saphena parva

Die Rezidive nach Lasertherapie können in drei Subtypen unterteilt werden. Eine klare Zuordnung vereinfacht die Therapieentscheidung und verbessert den Therapieerfolg

Adam Czerwinski, Johanna Lüttich-Buck, Christoph Albiker

109

AUS DER LITERATUR

Ultraschall bei Verdacht auf tiefe Venenthrombose: wie nützlich ist die Ein-Punkt-Beschleunigung?

Andrew S. McQueen

111

Inzidenz und Risikofaktoren der bilateralen tiefen Beinvenenthrombose

Ivan Benaduce Casella, Maria Alice Boscht, Cláudio Rogério Donmarco Sabbag

112

MOSAİK

Ulcus cruris venosum

Autolytisches Débridement verbessert den Wundstatus

115

Phlebologen treffen sich am Mittelmeer
XVI. Internationaler Kongress der UIP
im Fürstentum Monaco

116

INFORMATION

Neues aus der Industrie

118

Impressum

119

Termine

120