

Varia

- 281 J. Jerosch, M. Nasrilari, D. Liebsch, T. Filler
Mittelfristige Ergebnisse nach endoskopischem Release der Plantarfaszie (ERPF)

Schwerpunkt

- 288 J. Schröder, R. Reer, K. Mattes
Biomechanische Diagnostik in der orthopädischen Praxis: Zur Zuverlässigkeit der Messung von Rumpfkraft und Haltung in der Behandlung von Rückenschmerzen
- 295 T. Ernstberger, F. König, J. Krull, W. Schultz
Offene Standardnukleotomie – eine retrospektive Auswertung von 109 Patienten im Ergebnisvergleich zur Mikrodiskektomie

Varia

- 303 J. Jerosch, D. Mertens, T. J. Filler
Das spinoglenoidale Ligament – eine anatomische Untersuchung
- 310 U. Böhling, J. Scholz
Navigationsverfahren zur Optimierung der Implantation von Femurkappen-Endoprothesen

Abbildungen auf der Titelseite:
Skoliotische Patientin mit einem - schon oberflächlich mit bloßem Auge zu erkennenden - Beckenschiefstand. Wiederholte Messungen (Variationen zwischen 12 und 17 mm) erlauben eine sichere Quantifizierung für die Verordnung eines Beinlängenausgleichs (Absatzerhöhung/Fersenkeil/Einlage).

