



Ansprechen unter Nilotinib bei Resistenz  
Follow-up 24 Monate



MCoR=gute zytogenetische Remission


Wirkung von Nilotinib bei Resistenz in chronischer Phase

**436**



Fertilitätserhalt

**440**



versus CHOP-R: progressionsfreies Überleben

**462**

Adenokarzinom  
Zuteilung

**464**

## NEWS

- 434-435**..Bösartige Hirntumoren – Prognose verbesserte sich in den letzten Jahren deutlich: Interview mit Prof. Ulrich Bogdahn, Regensburg.
- 436-438**..Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie (DÖSGHO)...Nilotinib: Wirksam und gut verträglich in der Zweitlinientherapie der CML...Therapieentscheidung bei myelodysplastischen Syndromen oft nicht einfach.

## GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE

- 440-444**..Fertilitätserhalt bei Frauen mit Krebs. Roxana Popovici, Frauenklinik und Poliklinik der Technischen Universität München.
- 445-448**..Fertilitätserhalt: Retransplantation kryokonservierten Ovarialgewebes – eine experimentelle, aber aussichtsreiche Methode. Dr. Stefan Buchholz, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universität Regensburg.
- 449** ..... Konsequenzen aus der IES-Studie: Interview mit Prof. Olaf Ortman, Regensburg.
- 450** ..... Brustkrebs: Studie zum Zweiterkrankungsrisiko bei familiärem Brustkrebs ermöglicht individuelle Risikoabschätzung

## FORTBILDUNG

- 452-453**..Leukämie: Kosten diagnostischer Leistungen bei Leukämien am Beispiel der Zytogenetik bei MDS- und AML-Patienten. Torsten Haferlach und Wolfgang Kern, Gemeinschaftspraxis, Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie, München.

## INFOPORTAL

- 454-459**..Neue Zulassungen im Jahr 2009

## PHARMAFORUM

- 460-461**..Konversionstherapie beim kolorektalen Karzinom: Präoperative Bevacizumab-Gabe erhöht Chance auf Lebermetastasenresektion. Vor sekundärer Metastasen-Resektion den Tumor kontrollieren. Interview mit Prof. Dr. med Thomas Gruenberger, Universitätsklinik für Chirurgie, Wien/Österreich.
- 462-463**..Indolente NHL und Mantelzell-Lymphome: Bendamustin plus Rituximab schlägt CHOP-R um Längen.
- 464**.....NSCLC: Tumorphistologie ist Basis für die individualisierte Therapie.

## KONGRESSBERICHTE

- 465**.....NSCLC: Neue Perspektiven mit zielgerichteten Therapien: Bevacizumab und Erlotinib verlängern das Leben auch im Praxisalltag.
- 466**.....NSCLC: Hochpräzise Strahlentherapie kann Wachstum von Lungentumoren stoppen.
- 467**.....NSCLC: Zehn Jahre Docetaxel beim NSCLC / Einsatz auch als Konsolidierungstherapie.
- 468**.....Krebstherapie der Zukunft: Biomarker plus Medikament.
- 469**.....GIST: Patienten mit allen häufigen Exon-Mutationen im KIT-Rezeptorgen profitieren von Zweitlinientherapie mit Sunitinib.
- 470**.....Supportivtherapie: MASCC/ESMO sprechen Empfehlung für Palonosetron bei moderat emetogener Chemotherapie aus.
- 471-472**.....Supportivtherapie: Etablierte und neue Optionen der onkologischen Supportivtherapie.
- 473**.....Supportivtherapie: Welchen Stellenwert haben komplementäre Verfahren?
- 474**.....Mammakarzinom: RANK-Ligand-Inhibition ermöglicht osteoprotektive Therapie.
- 475**.....Supportivtherapie: Dreifachkombination bietet besseren Schutz bei moderat emetogener Chemotherapie.
- 476**.....Lymphome: Chemoimmuntherapie mit Rituximab: Standard in der Lymphomtherapie.

## NACHRICHTEN

- 477-480**...Frühes Mammakarzinom: Indikationserweiterung für Docetaxel in der EU beantragt...Tests für Blasenkrebs-Screening sensitiver als PAP-Test...Chemo-Resistenzen: PARP-I aktiviert den Genschalter NF-kappaB, der programmierten Zelltod verhindert...Fortgeschrittenes Prostata-CA: Medroxyprogesteron zur Behandlung von Hitzewallungen und GnRH-Analoga wirksamer als SSRI...Europaweite Untersuchung zeigt besorgniserregende Zahl Chemotherapie-induzierter Neutropenien...