

Therapie aktuell

- 3** Ältere Dame will keine Uhren malen – Bei Verdacht auf kognitive Störung: Hirnleistung mit CERAD prüfen!
- 4** Interaktives Programm hilft älteren Menschen, geistig flexibel zu bleiben – Senioren sollten Hobbys im Alter pflegen und nicht aufgeben
- 6** Auch noch Jahre nach überstandener Anorexie droht die Depression – Setzt Magersucht biologische Narben in der Hirnsubstanz?
- 8** Reizbarkeit oft als ADHS, affektive Störung als „Pubertätskrise“ verkannt – Auch bei Kindern und Jugendlichen auf Depressions-Zeichen achten!
- 11** Restless-legs-Syndrom plus Depression – Für die Therapie am besten ein Stufenschema nutzen
- 10** Der Patient hat schon leichte kognitive Einschränkungen ... – Neue Studie soll Aufschluss über das Demenz-Risiko geben
- 12** Wenn Depressive Suizidgedanken hegen ... – Wie lässt sich die Gefahr bannen?

Therapie im Fokus

- 14** Wenig Nebenwirkungen, einfache Applikation – Vom Alzheimer-Pflaster profitieren auch die pflegenden Angehörigen
- 14** Wenn die Depression mit Schmerzen einhergeht ... – Seele und Körper durch eine duale Transmitter-Hemmung helfen
- 15** Wichtiges Ziel in der Therapie der Alzheimer-Demenz: Die Alltagskompetenz der Patienten möglichst lange erhalten