

UROLOGIE

Das Alter ist der wichtigste Risikofaktor der postoperativen erektilen Dysfunktion nach radikaler nerverhaltender Prostatektomie	5
M. Gruschka, R. Kirschner-Hermanns, G. Jakse, H. Borchers	

Veränderungen kognitiver Funktionen unter LH-RH-Therapie bzw. unter Bicalutamid-Monotherapie	11
C. Brössner, P. Schramek, W. Kozak, R. Böhm, P. Holub, K. Dorfinger, G. Lunglmayr, B. Weidlich	

UROGYNAKOLOGIE

Verwendung von Polypropylen/Polyglactin 910- (PP910-) und Polypropylen/Polyglecapron 25- (PP25-) Netzen bei Beckenbodenprolaps – eine retrospektive Analyse	16
Ch. Schwegler, B. Demirdelen, P. Meier, Ch. Fünfgeld	

Chirurgische Therapie der Stressharninkontinenz (SUI) – Ein Überblick	23
P. Riss	

FÜBRIKEN

Fallbericht	
Komplette Remission unter Therapie mit Sunitinib bei einem lymphogen und pulmonal metastasierten Nierenzellkarzinoms	29
G. Pfleger, W. Kuber	
Pharma-News	33
Hinweise für Autoren	35
Impressum	33

Titelbild: Darstellung des Cooper'schen Ligaments (Pfeil A) und der Scheidenfaszie (Pfeil B) vor dem Platzieren der Nähte auf der linken Seite. Abbildung 2c aus P. Riss, S. 25