

686 Einsatz der Tyrosinkinase-Inhibitoren der zweiten Generation bei chronischer myeloischer Leukämie

Eine CML verläuft ohne Behandlung tödlich. Mit moderner Therapie kann die Krankheit heute bei vielen Patienten langfristig kontrolliert und damit das Überleben deutlich verlängert werden.

D. Heim

EMPFEHLUNGEN

690 Schweizer Konsensus zur Therapie mit Thrombozyten-Funktionshemmern in der Angiologie

K. A. Jäger, B. R. Amann-Vesti, M. Banyai, I. Baumgartner, M. Birrer, H. Bounameaux, C. R. Cañova, U. Frank, B. Frauchiger, A. F. Gallino, E. Gröchenig, D. Holtz, R. M. Jenelten, L. Mazzolai, H. Stricker, D. Desalmand

AUF-GELESENES


694 Hoffnung wider alles Wissen

B. Gurtner

695 Rezidivierende Synkopen und Thoraxschmerz bei einem jugendlichen Fussballspieler

Unser Fall illustriert, wie wichtig die Primärprävention des plötzlichen Herztods bei jungen Sportlern ist.

M. T. R. Grapow, F. M. Lampert, R. Handschin, J. Bremerich, F. Eckstein, T. Carrel

**LESERBRIEFE**

698 Suizidbeihilfe wegen «Lebensmüdigkeit»?

Walter Meili

698 Replik**COURRIER DES LECTEURS**

699 L'éthique est une affaire de limites ... Eviter d'aller vers le suicide en «libre service»

J. Martin

699 Réplique

C. Genton

700 PERISKOP
