

Inhalt

Regression der Atherosklerose durch intensive LDL-Cholesterin-Senkung mit Atorvastatin 1

Mehrere Vergleichsstudien zwischen Atorvastatin und anderen Statinen zeigen, dass mit Atorvastatin nicht nur die Progression der Atherosklerose gestoppt, sondern bei einem großen Teil der Patienten die Ausdehnung der atherosklerotischen Plaques reduziert werden kann.

Diskrepanz zwischen LDL-Cholesterin-Senkung und klinischer Wirkung 3

Die für Statine nachgewiesene Relation zwischen LDL-Cholesterin-Senkung und klinischer Effektivität gilt wahrscheinlich nicht für alle Substanzen. Professor März erläutert in einem Interview mögliche Ursachen und gibt konkrete Therapieempfehlungen.

Ezetimib erneut ohne klinischen Nutzen – die ARBITER 6-HALTS-Studie 3

Eine neue Studie, die Mitte November beim AHA in Orlando vorgestellt wurde, zeigte, dass mit Ezetimib im Vergleich zu Nikotinsäure kein klinischer Nutzen hinsichtlich der Progression der Intima-Media-Dicke der Karotiden erzielt werden kann und die Häufigkeit schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse deutlich höher ist als bei der Vergleichssubstanz.

Atorvastatin (Sortis®) – wirksam und gut verträglich von 10 bis 80 mg einsetzbar 4

Eine Metaanalyse zeigt, dass Atorvastatin auch bis zur Höchstdosis mit hoher Effizienz eingesetzt werden kann.