

INHALT

44. JAHRESTAGUNG DER DEUTSCHEN DIABETES-GESELLSCHAFT IN LEIPZIG

69TH SCIENTIFIC SESSIONS OF THE AMERICAN DIABETES ASSOCIATION IN NEW ORLEANS

KONGRESS-NEWS

- 5 BOT – gute Wahl auch unter ökonomischem Aspekt
- 6 130/80 mmHg – die magische Grenze bei Diabetikern
- 8 Kardiovaskuläre Sicherheit von Rosiglitazon im Blickpunkt
- 9 Insulin glargin mit Vorteilen bei älteren Typ-2-Diabetikern

IM FOKUS

- 10 Kinder: (Noch) ist eher Typ 1 das Problem
- 12 Neuer Standard in der Diabetes-Diagnostik?

FÜR DIE PRAXIS

- 14 Neue Leitlinien zur Therapie bei Diabetes Typ 2 – was ist neu?
KLAUS KUSTERER

- 18 INFOTHEK



HYPERTONE DIABETIKER benötigen bereits bei Werten ab 130/80 mmHg eine Therapie mit Antihypertensiva.



BEI KINDERN steigt die Inzidenzrate für Typ-1-Diabetes seit Jahren. In Deutschland betrifft dies derzeit etwa 2000 Kinder.



BEI TYP-2-DIABETES wird außer der Änderung des Lebensstils jetzt zusätzlich Metformin zum Therapiestart empfohlen