

NEWS

- 162-166**24. Jahrestagung der European Association of Urology (EAU) 2009:
Kleine Nierenkarzinome minimal-invasiv behandeln: Eine Biopsie ist immer hilfreich...Prostatakarzinom T0-2: Operieren oder „watchful waiting“?...PCA3 als neuer Marker für die Aggressivität des Prostatakarzinoms...Chemotherapie des Blasenkarzinoms: Patienten-selektion ist der Schlüssel zum Erfolg...Kryotherapie beim Prostatakarzinom: Experimentell mit Kälte gegen Knochenmetastasen

PROSTATAKARZINOM

- 167-171**Hochintensiver fokussierter Ultraschall (HIFU) – Stellenwert in der Therapie des Prostatakarzinoms. Roman Ganzer, Hans-Martin Fritsche, Wolf F. Wieland, Andreas Blana, Klinik und Poliklinik für Urologie der Universität Regensburg.
- 172-173**Systemische Therapie fortgeschrittener urogenitaler Krebserkrankungen, Teil II: Prostatakarzinom. W. Otto, Onkologische Sprechstunde der Klinik und Poliklinik für Urologie der Universität Regensburg.
- 174-175**Palliativsituation: Verbesserte Lebensqualität und Überlebenszeit durch Taxan-Therapie. Interview: Intermittierende Therapie als Option für schlecht belastbare sowie ältere Patienten. Gerson Lüdecke, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH.
- 176-180**Studie: Lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom: Überlebensvorteil durch kombinierte endokrine Therapie plus Radiotherapie. Kommentar: PD Dr. Barbara Dietl, Universitätsklinikum Regensburg.

KOPF-HALS-TUMOREN

- 180-192**Innovative Therapiestrategien bei Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Hals-Bereiches. Magis Mandapathil^{1,2}, Simul D Parikh³, Julia Isselstein⁴, Christoph Pöttgen⁵, Thomas K. Hoffmann¹, Konrad Sommer⁶, Reinhard Zeidler⁷, Theresa Whiteside², Stephan Lang¹; ¹Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, ²Abteilung für Pathologie, University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, PA, USA, ³Abteilung für Radioonkologie und Strahlentherapie, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, USA, ⁴Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Münster, ⁵Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, ⁶HNO-Klinik des Marienhospitals, Osnabrück, ⁷Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Klinikum der Universität München.

KONGRESSBERICHTE

- 193**Hepatozelluläres Karzinom: Sorafenib langfristig wirksam und sicher bei verschiedenen Patientensubgruppen
- 194**GIST: Imatinib jetzt auch zur adjuvanten postoperativen Therapie Gastrointestinaler Stromatumoren bei Risikopatienten zugelassen
- 195-198** Tumorschmerz: Retardierte Darreichungsform von Hydromorphon bei chronischem Tumorschmerz hoch wirksam....Fixkombination aus retardiertem Oxycodon und retardiertem Naloxon vermindert Risiko Opioid-induzierter Obstipation...Opioid-induzierte Obstipation: peripher wirkender Opioid-Rezeptorantagonist bietet schnelle und planbare Lösung...Palliativmedizin: Durchbruchschmerzen mit schnellwirksamem Fentanyl lindern
- 199**Glioblastom: Konkomitante Gabe von Temozolomid zur Radiotherapie verbessert Überlebensrate
- 200**Kopf-Hals-Tumoren: Neoadjuvantes Chemotherapie-Dreier-Regime besonders effektiv

PHARMAFORUM

- 201**Emesis: Aktualisierte NCCN-Empfehlungen berücksichtigen Sonderstellung von Palonosetron
- 202-203** .. Aktuelle Auswertung der BIG 1-98-Studie mit Letrozol: Überlebensvorteil für nodalpositive Patientinnen

NACHRICHTEN

- 204-207** ...Prostatakarzinom: Entzündungshemmende Proteine bremsen Tumorwachstum...Nierenzellkarzinom: Patienten-Broschüre zur Therapie mit Temsirolimus...NET des Rektums werden häufiger diagnostiziert... Frauen empfindlicher gegenüber Tabak-Karzinogenen...European Association of Urology hebt Benefit des PSA-Screenings hervor... Harnblasenkarzinom: niedrigere Überlebensrate bei Frauen/Urintest zur Früherkennung...Phase-III-Studie SAPPHERE mit Trabectedin bei rekurrentem/refraktärem anaplastischen Astrozytom... Umfrage: Frauen sagen „ja“ zum Mammographie-Screening...Prostatakrebs: Tumor-RNA aus Urin-Exosomen als Biomarker?...Hautkrebs: 135.000 Neuerkrankungen im Jahr 2008 in Deutschland...Gefitinib zur Therapie des lokal fortgeschrittenen/meta-stasierten NSCLC für alle Therapielinien empfohlen...Matrix-Metalloproteinasen-Analyse: MMP8 in Melanomzellen oft mutiert...Neues Onkogen UTX identifiziert...Zulassung für Kombination Lapatinib/Letrozol bei metastasiertem Brustkrebs beantragt... 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie... ITP: Markteinführung von Romiplostim in Deutschland