



Früherkennung von Darmkrebs

Die Untersuchung auf okkultes Blut im Stuhl ist ein wichtiger Bestandteil im Aufspüren von Adenomen. Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum zeigen nun, dass Antikörpertests dem klassischen enzymatischen Verfahren zwar überlegen sind, es aber große Unterschiede zwischen den Immuntests selbst gibt.

6



Sport senkt Mammakarzinom-Risiko

Neu ist das nicht: Regelmäßige körperliche Aktivität senkt das Brustkrebsrisiko von Frauen. Unbekannt war jedoch bisher, wie viel Sport in welcher Lebensphase sinnvoll ist, damit sie von dem Schutzeffekt profitieren. Zudem war wenig erforscht, welche Art von Brusttumoren beeinflusst wird. Antworten auf die Fragen gibt MARIE, die Mammakarzinom-Risikofaktoren-Erhebung.


8



Aktuelle AGO-Leitlinien

Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie e. V. (AGO) empfiehlt in ihren aktuellen Leitlinien den Einsatz von Aromatasehemmern in der erweiterten adjuvanten Therapie (EAT) nach fünf Jahren Tamoxifen. Besonders der Therapiebeginn im Anschluss an ein langes Tamoxifen-freies Intervall wurde aufgewertet.

10



Erstlinientherapie von Kopf-Hals-Tumoren

Für Patienten mit lokal fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich gibt es jetzt eine therapeutische Option, die erstmals seit 30 Jahren einen markanten Fortschritt in dieser Indikation darstellt.

Die Arztpraxis in Krise und Insolvenz

In diesem Teil der Serie „Die Zukunft hat begonnen“ behandelt Dr. Ralph Steinbrück die Möglichkeit zur Fortführung der Praxis, die Unterhaltsgewährung, Altersvorsorge und das „Ziel aller Ziele“ – die Restschuldbefreiung.

Nebenwirkungen und Haftung

Bei der Anwendung von Arzneimitteln muss immer damit gerechnet werden, dass unerwünschte Wirkungen auftreten, die der Fortführung der Therapie entgegenstehen und im Extremfall bleibende Schäden auslösen.