BERUF, PRAXIS, POLITIK, GESELLSCHAFT

FMP

794 Protocole de l'Assemblée générale ordinaire de la FMP

Du 17 juin 2010 à l'Hotel Bern à Berne De Thomas Zünd

Protokoll der Generalversammlung der FMP Sektion Romandie

Vom 17. Juni 2010 im Hotel Bern in Bern Von Guy Evéquoz

RUBRIKEN

MEDIEN, MODEN, MEDIZIN

788 Leistenbruch-Operationen häufig vermeidbar

- Mammakarzinom: weniger Hormone, weniger Krebsdiagnosen
- Rosenbergstrasse 115

ARSENICUM

790 Nomen nescio

CARTOON

791 Zubi zeichnet

POLIT-FORUM: XUNDHEIT IN BÄRN

- 792 Mangel an Pflegepersonal Massnahmen zur Vermeidung von Berufsausstiegen
 - Prävention und WHO was kommt auf uns zu?

ECHO

799 «... nicht auf diesem Niveau»

Zuschrift zum Editorial «Das Cassis-de-Montagnola-Prinzip»
in ARS MEDICI 18/10, S. 697

PHARMA NEWS

- Mepha bietet neu in der Schweiz mit Actiq® (Fentanylcitrat) und Modasomil® (Modafinil) zwei innovative Therapieformen für Patienten und Fachpersonen des Gesundheitswesens an
- US3 Magnesiocard® bei nächtlichen Wadenkrämpfen wirksam und gut verträglich

IMPRESSUM/VORSCHAU

832 Themen in den nächsten Ausgaben

MEDIZIN

BERICHT

797 Chondroprotektiva: «Die Akte ist nicht geschlossen»

Der Rheumatologe Hansjörg Häuselmann hält einen Nutzen der umstrittenen Arthrosemedikamente für möglich

801 Gliptine bei Typ-2-Diabetes

Zur Mono- und Kombinationstherapie geeignet Von Alfred Lienhard

803 Ich sehe was, was du nicht siehst

Was Bildgebung und Neuropsychologie bei leichten traumatischen Hirnverletzungen leisten können und was nicht

FORTBILDUNG

808 Commotio cerebri

Standards in der Akutversorgung der leichten traumatischen Hirnverletzung Von Sönke Johannes und Rita Schaumann-von Stosch

813 Arbeits- und Wiedereingliederungsfähigkeit bei Epilepsien

Ärztliche Beurteilung muss Komorbiditäten berücksichtigen Von Thomas Dorn und Klaus Fetscher

820 Aktuelle Schmerztherapie in der Onkologie

Allgemeines zielführendes Vorgehen Von Daniel Büche

PRAXISERFAHRUNGSBERICHT

826 Die Anwendung von retardiertem Acemetacin unter Praxisbedingungen

Von Jürg Ryser

STUDIE REFERIERT

830 HbA1c und Diabetesrisiko

Glykosiliertes Hämoglobin gilt als neuer Risikomarker