

Magazin

- 246 Patienten zu mehr Eigenverantwortung erziehen – Blutzucker-Selbstkontrolle heute – und in Zukunft?
- 249 Herzinfarktpatienten mit Diabetes – ISAR-RISK-Studie: Vorhersage des plötzlichen Herztodes möglich
- 250 Nierenerkrankungen bei Diabetes – Nationale VersorgungsLeitlinie veröffentlicht

Praxismanagement

- 252 Schlichten statt richten – Fehler in der Medizin – Bundesärztekammer stellt Behandlungsfehler-Statistik 2009 vor

Deutsche DiabetesStiftung (DDS)

- 278 Gesünder leben mit Diabetes Typ 2 – Selbstmanagement Diabetes Typ 2 zuhause über den Bildschirm

Forum der Industrie

- 281 Albuminurie signalisiert renale und kardiovaskuläre Komplikationen – ROADMAP: Unter Olmesartan entwickelte sich seltener eine Mikroalbuminurie
- 282 Inkretinbasierte Therapie bei Typ-2-Diabetes – Sitagliptin auch zur Monotherapie und in Kombination mit Insulin zugelassen
- 286 Sichere Therapie für Typ-2-Diabetiker – Effektive HbA_{1c}-Senkung ohne Unterzuckerung und Gewichtszunahme
- 287 Läuft hier etwas falsch? – Die richtige Strategie bei der Therapie des Typ-2-Diabetes
- 288 Gefäßprotektion – Nutzen über den HbA_{1c} hinaus
- 289 Diabetische Polyneuropathie – Therapie des neuropathischen Schmerzes
- 289 Typ-2-Diabetes – Blutdrucktherapie mit Gefäßprotektion
- 290 Typ-2-Diabetes – Früh und aggressiv behandeln

Editorial

- 243 Diabetes – und schon vergessen?
Bergmann A, Schwarz PEH; Dresden

Schwerpunkt

- 257 Diabetes und Demenz – Typ-2-Diabetiker haben ein erhöhtes Demenzrisiko
Matz K, Brainin M; Krems (Österreich)
- 263 Diabetes und Niere – Diabetische Nephropathie auf dem Vormarsch
Pistrosch F, Dresden

Kasuistik

- 269 Ketoazidose bei Urosepsis und Typ-1-Diabetes – Ein Fall für die Intensivstation
Schöll E, Fischer M; Liestal

- 274 CME-Fragebogen