

C. Müller, C. Herzog, F. Sommer, J. C. Böck

**Malignome der Prostata bei Patienten mit invasivem Harnblasen-
karzinom: Onkologische Auswirkungen auf mögliche apexerhaltende
Zystektomieverfahren**

12

G. Gakis, A. Stenzl

Harnröhrenstriktur: Ursachen, Klassifikation, Diagnostik und Behandlung

16

V. Klevecka, D. Kröpfl, M. Musch

Präoperative urogynäkologische Diagnostik

26

V. Viereck, J. Kociszewski, J. Eberhard

RUBRIKEN

Nachruf Prof. Dr. H. A. Janisch (1927–2010)

34

Kongressbericht

**Sunitinib (Sutent®) – Optimales Outcome mit zielgerichteten Therapien
beim Nierenzellkarzinom: Gegenwart und Zukunft**

36

S. Seidel

Pharma-News

38

Impressum

15

Titelbild: Graphische Darstellung der präoperativ ermittelten PSA-Werte der 26 Patienten mit inzidentellem Prostatakarzinom bei intra- vs. extraapikaler Lage und signifikantem vs. insignifikantem Prostatakarzinom (angegeben als Mittelwerte \pm S.E.M., PSA-Follow-up: 14,3 Monate; 3–32). PCA = Prostatakarzinom, PSA = Prostataspezifisches Antigen. Abb. 1 aus G. Gakis, A. Stenzl, S. 13.