

■ Editorial Editorial

7 2010 – Neues Jahr, neues Layout!

2010 – New year, new layout!
Daniela Oesterle

■ Laudatio Laudation

8 Dank an Katja Kemeter

Thanks to Katja Kemeter
B. Strittmatter

■ Standorte Locations

10 Postoperative Komplikationen nach Stapler-Hämorrhoidopexie (PPH) und STARR-Operationen

Postoperative complications after the procedure for prolapsed and hemorrhoids (PPH) and stapled transanal rectal resection (STARR) procedures
M. Pescatori

23 Sexual- und Blasenfunktion bei Männern nach laparoskopischer totaler mesorektaler Exzision

Male sexual and urinary function after laparoscopic total mesorectal excision
M. Morino · M.E. Allaix · G. Monasterolo · C. Garrone

■ Übersichtsarbeit Review article

30 Primäre und sekundäre Wundheilung nach Pilonidalsinus-operation

Primary and secondary wound healing after pilonidal sinus
S. Petersen

■ Update Update

34 Proktologie

Proctology
A. Herold

43 Divertikulitis

Diverticulitis
T.H.K. Schiedeck

■ Journal Club Journal Club

62 ETVARD („endoscopic transanal vacuum-assisted rectal drainage“) führt zu vollständiger, aber verzögerter Heilung extraperitonealer rektaler Anastomoseninsuffizienzen nach neoadjuvanter Radiochemotherapie

ETVARD (endoscopic transanal vacuum-assisted rectal drainage) leads to complete but delayed closure of extraperitoneal rectal anastomotic leakage cavities following neoadjuvant radiochemotherapy
A.K. Joos

63 STARR-Operation wegen obstruktiven Defäkationssyndroms. 1-Jahres-Ergebnisse des europäischen STARR-Registers

Stapled transanal rectal resection for obstructed defecation syndrome: one-year results of the European STARR Registry
K. E. Matzel

49 Endorektale Sonographie. Teil 2: Anus

Endorectal sonography · Part 2: Anus
A. Kölln

58 CME-Fragebogen

Questionnaire

65 Loop-Ileostomie vs. Loop-Kolostomie zur Stuhlableitung nach kolorektaler Anastomose. Eine Metaanalyse

Loop ileostomy versus loop colostomy for fecal diversion after colorectal or coloanal anastomosis: a meta-analysis
P. Kienle

67 STARR-Operation mit dem Contour® Transtar™. Eine prospektive multizentrische Studie

STARR with Contour® Transtar™: prospective multicentre European study
R. Ruppert

68 Ein quantitativer immunologischer Stuhltest auf okkultes Blut bei kolorektaler Neoplasie

Comparative evaluation of immunochemical fecal occult blood tests for colorectal adenoma detection.
M. Sailer

■ Hot Topic Hot topic

71 Pelvic Sepsis – perzipieren, diagnostizieren, therapieren

Pelvic sepsis – perceive, diagnose, treat
C. Eckmann

■ Verschiedenes Miscellaneous

75 Im Gespräch Interview

77 Aus der Gesellschaft From the Society

78 Chronik DGK Chronicle of the DGK

78 Chronik BCD Chronicle of the BCD

79 Kongressprogramm und Abstract Congress programm and abstracts

101 Aktuelles aus der Industrie Pharma News

104 Impressum Imprint