



8

Selbstverletzendes Verhalten


„Non-suicidal self-injury (NSSI)“ ist bei Jugendlichen häufiger als angenommen. Verlässliche Studien zu Therapieoptionen fehlen jedoch.



14

Lyme-Borreliose

Hautmanifestation: Die Akrodermatitis chronica atrophicans gilt als dermatologisches Leitbild des Endstadiums der Lyme-Borreliose.



44

Management

In Bremen wird der Beruf von Ärzten und Psychotherapeuten jetzt familienfreundlicher - durch eine dreijährige Elternzeit..

Forum Medizin

- 6 Aufgeklärt: Keine Hirntumore durch Handys
- 6 Knochenmark gegen Zwangsstörungen
- 7 Depression: Verhaltenstherapie ist alltagstauglich
- 7 Stammzellen im lebenden Gehirn beobachtet
- 8 Schneiden, Brennen, Ritzen
- 10 Bipolare Störungen früh erkennen
- 12 Buchverlosung: „Der Augensammler“
- 14 Zeckenszeit: Lyme-Borreliose & FSME
- 20 MS und Infektionen nicht verwechseln
- 22 Neues aus Industrie und Forschung

Forum Management

- 44 Drei Jahre Elternzeit auch für Ärzte
- 44 IGeL: Nutzen für Patienten und Ärzte
- 45 Beipackzettel meist viel zu kompliziert
- 46 Neu: Qualifikationsgebundene Zusatzvolumen
- 48 Fragen und Antworten zu GOÄ und IGeL

→ **Titelthemen**

→ **Fokus: Der alte Patient**


- 24 **Behandlungsbedürftig verwirrt**
Das Delir ist ein häufiges und immer lebensbedrohliches Krankheitsbild und besitzt deshalb eine große Relevanz in der alltäglichen klinischen Behandlung älterer Menschen.
- 28 **Epilepsie im Alter richtig behandeln**
Krampfanfälle im Alter unterscheiden sich von der epileptischen Erkrankung jüngerer Patienten. Bei der Behandlung müssen altersspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden.
- 32 **Depressionen: Keine normale Alterserscheinung**
Als bei älteren Patienten massiv untertherapierte Erkrankung verlangen Depressionen dringend nach mehr Beachtung. Denn: Sie sind im Alter ebenso gut behandelbar wie in jüngeren Jahren.
- 34 **Der alte Mensch in der Praxis**
Ältere Patienten leiden oft an mehreren somatischen Erkrankungen und nehmen unterschiedliche Medikamente ein. Die Therapie psychischer Störungen darf dennoch nicht vernachlässigt werden.
- 36 **CME-Fragebogen**
- 37 **Medien: Fachbücher, Ratgeber und Internetseiten zu gerontopsychiatrischen und -neurologischen Themen**

Seitenblick

- 50 **Vom Armenhaus zur Hightech-Klinik**

Termine

- 51 **Kongresse und Tagungen im Juni und Juli**
- 51 **Impressum**



28

Bei Epilepsie

Das Rezidivrisiko nach einem ersten Anfall im Senium liegt bei 83 Prozent. Erneute Anfälle zu vermeiden, ist ein wichtiges Therapieziel.



34

Im Praxisalltag

Komorbidität und Polypharmazie lassen viele Ärzte vor der Behandlung psychischer Störungen bei Älteren zurückschrecken.



50

Seitenblick

Eine Ausstellung im Berliner Medizinhistorischen Museum blickt auf den Werdegang der Charité vom Armenhaus zur Hightech-Klinik.