

## EMCC 2011

- 390-392.....** BOLERO-2-Studie – Fortgeschrittener postmenopausaler Brustkrebs: 7 Monate längeres PFS mit Everolimus plus Exemestan ... Neue Medikamente und Biomarker für personalisierte Therapien bei Nieren- und Lungenkrebs ... Identifizierung von Subgruppen mit Überlebensvorteil beim metastasierten Kolorektalkarzinom ... Erhaltungstherapie mit Bevacizumab und Pemetrexed halbiert Progressionsrisiko beim NSCLC

## UPDATE 2011

- 393-402.....** Magenkarzinom und Adenokarzinom des ösophago-gastralen Übergangs. Florian Lordick<sup>1</sup>, Guido Schumacher<sup>2</sup>, <sup>1</sup>Medizinische Klinik III (Hämatologie und Onkologie), Klinikum Braunschweig und Medizinische Hochschule Hannover, <sup>2</sup>Chirurgische Klinik, Klinikum Braunschweig und Universitätsmedizin Charité Berlin
- 404-408.....** EAU-Guidelines 2011 beim muskelinvasiven und metastasierten Urothelkarzinom der Harnblase. J. Bründl, S. Denzinger, W.F. Wieland, W. Otto. Klinik für Urologie der Universität Regensburg

## BIOMARKER / PROGNOSEPARAMETER

- 409-414.....** Prognoseparameter des frühinvasiven Harnblasenkarzinoms. W. Otto, H.M. Fritsche, M. Burger, W. Rößler, W.F. Wieland, S. Denzinger. Klinik für Urologie der Universität Regensburg
- 416-421 .....** Etablierte Biomarker bei der individualisierten Therapie solider Tumoren – aktuelle klinische Standards. Jörg Trojan<sup>1</sup>, Sylvie Pätzold<sup>2</sup>, Eugen Ruckhäberle<sup>3</sup>, <sup>1</sup>Medizinische Klinik I, <sup>2</sup>Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, <sup>3</sup>Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

## FORTBILDUNG

- 422-429.....** Metastasenresektion urologischer Tumoren. Axel Heidenreich, David Pfister, Bernhard Brehmer, Klinik für Urologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
- 430-434.....** Die Bedeutung der Bisphosphonat-Therapie beim multiplen Myelom. Hartmut Goldschmidt, Universitätsklinikum Heidelberg

## PHARMAFORUM

- 435.....** ALSYMPCA-Studienergebnisse und Neues aus der Pipeline
- 436.....** Bevacizumab plus Interferon: Effektive und verträgliche Firstline-Therapie beim fortgeschrittenen RCC
- 437-440 .....** Fortgeschrittenes NSCLC mit aktivierenden EGFR-Mutationen: Europäische Empfehlung für Gefitinib-Therapie

## KONGRESSBERICHTE

- 441-442.....** Prostatakarzinom: Effektive Testosteron-Suppression korreliert mit Überlebensvorteil ... Neue Therapieoption durch Abirateronacetat ... Adäquate Kontrolle des Therapieverlaufs und Praxiserfahrungen mit Cabazitaxel

## NACHRICHTEN

- 443 .....** AML: Hochrisikopatienten profitieren von Clofarabin als neuem Kombinationspartner ... Phase-III-Studie mit Regorafenib bei fortgeschrittenem Darmkrebs erreicht primären Endpunkt ... EU-weite Zulassungserweiterung für Pemetrexed zur Erstlinien-Erhaltungstherapie beim fortgeschrittenen nicht-plattenepithelialen NSCLC ... Hoher Stellenwert von Cetuximab in der Therapie von Kopf-Hals-Tumoren