

## NEWS

- 6-20** ..... **52. Jahrestagung der American Society of Hematology:** Asymptomatisches follikuläres Lymphom: Rituximab vs. Beobachtung ... PRIMA-Studie: Auch nach drei Jahren Vorteil für Erhaltungstherapie ... Mantelzell-Lymphom: Neuer Standard für die Frontline ... NHL und Mantelzell-Lymphom: Bendamustin/Rituximab wirksamer als Fludarabin/Rituximab ... Hodgkin-Lymphom: BEACOPP eskaliert ist ABVD überlegen ... DLBCL: MInt-Studie zeigt anhaltenden Überlebensvorteil durch Hinzunahme von Rituximab ... Transplantation beim Multiplen Myelom verlängert PFS und Gesamtüberleben ... Erhaltungstherapien mit Lenalidomid ... Rezidiertes Multiples Myelom: Bortezomib subkutan so wirksam wie i.v. und besser verträglich ... Nabelschnurblut: Doppelspende bei akuten Leukämien vorteilhaft ... Multiples Myelom: Autolog-allogene Doppeltransplantation ohne Nutzen ... DKMS: Kein erhöhtes Tumorrisiko nach Stammzellspende ... CML: 24-Monatsdaten zeigen kontinuierliche Überlegenheit von Nilotinib im Vergleich zu Imatinib ... 18-Monatsdaten der DASISION-Studie ... TET2 als bedeutender Marker für verschiedene hämatologische Tumorerkrankungen bestätigt ... Interview mit Prof. Matthias J. Rummel: „Romiplostim hat Musik in die Therapie der ITP gebracht.“
- 22-24** ..... **33. San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2010:** Neoadjuvante Behandlungen im Fokus ... Duale Anti-HER2-Blockade auf dem Vormarsch – NEO-ALTTO ... Deutsche GepardQuinto-Studie mit überraschendem Ausgang ... Kombination Trastuzumab/Pertuzumab führt zu stärkerer Blockade der Signalwege ... Verbesserte Krankheitskontrolle durch Fulvestrant 500 mg ... AZURE: Bisphosphonat-Mechanismus ist komplizierter als angenommen ... Vorteil für Taxan-haltige Therapie in der Adjuvanz.

## INTERVIEW

- 25-26** ..... **Nutzen einer Krebstherapie – Dreh- und Angelpunkt ist die Qualität.** Interview mit Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Hohenberger, Chirurgische Universitätsklinik Erlangen.

## KONTROVERSEN

- 27-30** ..... **Neoadjuvante Therapie beim Magenkarzinom. Pro:** Stefan P. Mönig, Arnulf H. Hölscher, Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie der Universität zu Köln.
- 32-36** ..... **Neoadjuvante Therapie beim Magenkarzinom. Contra:** A. Kutup, S. Mina, Jakob R. Izbicki, Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf.
- 37-39** ..... **PET/CT bei Gliomen:** Stellungnahme zum Bericht des IQWiG zum Nutzen der PET und PET/CT zur Rezidivdiagnostik bei Gliomen mit hohem Malignitätsgrad. Karl-Josef Langen, Institut für Neurowissenschaften und Medizin, Forschungszentrum Jülich.

## NIERENZELLKARZINOM

- 40-41** ..... „Ganz entscheidend für die Wahl der Therapie ist auch die Komorbidität des Patienten“. Interview mit PD Dr. med. Michael Siebels, Urologie München Pasing und Urologische Belegabteilung Rotkreuzklinikum München.

## SUPPORTIVTHERAPIE

- 42-47** ..... **Das tumorassoziierte Fatigue-Syndrom.** Manfred E. Heim, Sonnenberg-Klinik Bad Sooden-Allendorf, Petra Feyer, Klinik für Strahlentherapie, Radioonkologie und Nuklearmedizin, Vivantes-Klinikum Neukölln, Berlin.

## PHARMAFORUM

- 48-49** ..... **NSCLC:** Histologische und immunhistochemische Diagnose ermöglicht individualisierte Erstlinientherapie.

## KONGRESSBERICHTE

- 50-51** ..... **HER2-positiver Brustkrebs:** Vinorelbin plus Trastuzumab effektive Alternative zur Standardtherapie.  
**Neueste Studienergebnisse zur Supportivtherapie in der Onkologie.**  
**Morbus Cushing:** Pasireotid könnte eine wirksame Therapieoption darstellen.

## NACHRICHTEN

- 52-55** ..... Erfolgreicher Abschluss der Lilly Onkologie Charity-Auktion ... Therapie solider Tumore ... Krebspatienten: Verzehr von Weichkäse meiden ... Akromegalie: Gene aus dem 18. Jahrhundert helfen Patienten von heute ... Invasive Pilzinfektionen in der Intensivmedizin: Risikostratifizierung ... Second-Line-Therapie des fortgeschrittenen NSCLC/TITAN ... RCC-Register bestätigt Stellenwert von Sunitinib und Temsirolimus in der Erstlinientherapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC) ... Bayer startet Phase-III-Studie mit Regorafenib bei metastasierten oder inoperablen Stroma-Tumoren im Gastrointestinalbereich ... Chemotherapie-induziertes Erbrechen ... Bendamustin: Deutsche Experten beurteilen aktuelle Studienergebnisse vom ASH 2010 ... Internationales Krebsgenom-Konsortium: genetische Grundlagen von Prostatakrebs ... Hohe Ansprechraten invasiver Mykosen auf Caspofungin bei transplantierten Patienten ... Malignes Melanom: Natürliche Killerzellen sollen Tumoren effektiv bekämpfen ... Carreras Leukämie-Stiftung ... Darmkrebs – neuer Gen-Signaturtest zum Metastasenrisiko.