

DRITTE SEITE

| | |
|--|---|
| Energy Drinks ebnen den Weg in die Abhängigkeit: Risiko aus der Dose massiv unterschätzt? | 5 |
| Besonders Ungeübte gefährdet: Tod durch Sex und Sport | 5 |
| Menschlicherer Umgang mit Demenzkranken: „Prothetisches“ Betreuungskonzept – eine Vision? | 5 |

DEMENTIELLE SYNDROME

| | |
|---|---|
| CME: Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT): Bildungsgrad beeinflusst die Kortextdicke | 6 |
| Alzheimer-Forschung: A β – IVIG aktivieren protektive Immunreaktion | 6 |

MULTIPLE SKLEROSE

| | |
|--|---|
| Fünfjahresverlauf bei früher MS: Anfängliche Ventrikel- vergrößerung prädiziert die Behinderungszunahme | 7 |
| IFN β -1a (i.m.) und Natalizumab: Bewährte und innovative Therapieoptionen bei der MS | 7 |
| STENO | 8 |
| Bei MS früh auf die Kognition achten: Verschlechterungen bei einem Drittel der Patienten | 8 |
| Basistherapeutika im Vergleich: Weniger kortikale MS-Herde unter IFN β -1a (s.c.) | 8 |
| BDNF-Effekte im MS-Tiermodell: Basistherapeutikum Glatirameracetat vermittelt axonalen Schutz | 9 |
| Kasuisitik: Gedächtnisstörung als seltenes MS-Prodrom? | 9 |

ADHS

| | |
|---|----|
| CME: Kinder mit ADHS: Komorbide Erkrankungen mit Folgen | 10 |
|---|----|

PARKINSON-SYNDROME

| | |
|---|----|
| Riechstörungen: Prädiktor für den Verlauf? | 12 |
| Motorische und nicht-motorische Symptome: Umfassende Besserungen unter Rasagilin | 12 |
| IM FOKUS | 12 |

KONGRESS

| | |
|--|----|
| 7. Deutscher Parkinson-Kongress, Kiel, 10. bis 12. März 2011 | 14 |
|--|----|

SCHIZOPHRENIE

| | |
|---|----|
| CAVE: Antipsychotika-Therapie: Obstipation erkennen und behandeln | 15 |
| ZNS-Infektionen in der Kindheit: Doch kein höheres Schizophrenie-Risiko? | 15 |
| FORSCHUNG & ENTWICKLUNG | 15 |

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

| | |
|--|----|
| CME: Schlaganfall: Neue US-Leitlinien zur Primärprävention | 16 |
|--|----|

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

| | |
|--|----|
| Major Depression: Schlechtes Ansprechen bei Psychose-Zeichen | 17 |
| Therapieoption Escitalopram: Aktuelle Entwicklungen auf dem Feld der Depression | 17 |

SUCHT

| | |
|--|----|
| CME: Heroinabhängigkeit: Stationärer Entzug mit Vorteilen | 18 |
| Cannabis bei sozialer Phobie: Auf das Vermeidungsverhalten achten! | 18 |

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

| | |
|--|----|
| CME: Langzeit-Outcome bei RLS: Schlaf und Funktionsniveau drei Jahre nach der Diagnose | 20 |
| Idiopathisches vs. Parkinson-RLS: Höchst unterschiedliche Echogenität der S. nigra | 20 |

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

| | |
|--|----|
| Akupunktur bei WS-Schmerzen: Schmerzen und Lebensqualität gebessert? | 21 |
| Zephalalgien bei Frauen mit Makromastie: Erhebliche Besserung durch Brustreduktion | 22 |
| Triptane plus SSRI/SNRI: FDA-Positionspapier zum Serotonin-Syndrom | 22 |
| Migräne und Clusterkopfschmerz: Nadelfreier Sumatriptan-Pen erleichtert die Therapie | 22 |

VARIA

| | |
|--|----|
| CME: Missbrauch in der Kindheit: Auch die kognitive Entwicklung wird beeinflusst | 24 |
| INTERNET-TIPPS „Demenz“ | 24 |

ANGST-/ZWANGSSTÖRUNGEN

| | |
|---|----|
| CME: Generalisierte Angsterkrankung: CBT verbessert auch die Berufsausübung | 25 |
| Bindungsstudie zeigt Dopamin-Störung bei Zwang | 25 |

EPILEPSIE

| | |
|---|----|
| US-Daten zur TLE-Chirurgie: Geringe Morbidität und kein Todesfall | 26 |
| Ein Kombinationspartner der ersten Wahl: Frühe Zusatztherapie mit Lacosamid | 26 |

SCHLAF

| | |
|---|----|
| Obstruktive Schlafapnoe: Korrelieren morphologische Hirnveränderungen und kognitive Beeinträchtigungen? | 28 |
| Impressum | 28 |
| Bestellcoupon | 21 |
| FÜR DIE PRAXIS | 29 |
| CME: Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen | 31 |