

**HER2-Distribution unter Alltagsbedingungen**

**Seite 3**

• **Übersichtsbeitrag von Dr. Bettina Conrad, Kassel.** Die in Studien-Kollektiven ermittelte HER2-Positivitätsrate liegt zwischen 20% und 30%. Welche Verteilung zeigte sich in einer retrospektiven Analyse eines Nicht-Studien-Kollektives? Welche Assoziation bestand zwischen HER2-Positivität und Estrogen- und Progesteronrezeptorstatus? Wie hoch war der Anteil der triple-negativen Mammakarzinome?

**HER2-positives Mammakarzinom: Gute Wirksamkeit von Trastuzumab auch in der Kombination bestätigt** • Kongressbericht

**Seite 5**

**Seite 8**

**Ibandronat lindert Knochenschmerzen** • Internationale Literatur

**Seite 9**



© Evans | SPL | Agentur Focus

**Fortgeschrittenes NSCLC: 17 Monate stabile Erkrankung mit Erlotinib** • Kasuistik

**Seite 10**

**Metastasiertes malignes Melanom: BRAF-Kinase-Hemmer „zukünftiger Standard“?** • Kongressbericht  
**BRIM3-Studie: Überlebensvorteil erreicht** • Studie

**Seite 11**

**First-line-Therapie der CLL: Erstmals Verlängerung des Gesamtüberlebens** • Internationale Literatur

**Seite 12**

**Chronische lymphatische Leukämie: Bald eine gut kontrollierbare Erkrankung?** • Kongressbericht

**HER2-positives Mammakarzinom, IHC3+; Quelle: Prof. Dr. Josef Rüschoff, Targos Molecular Pathology GmbH, Kassel**

