

Inhalt

| Experte | Frage | Thema | Seite |
|--------------|---|-------|-------|
| B. Wille | Ist die zweifache Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen sinnvoll? | | 4 |
| T. Glück | Untersuchung bei ESBL-Patient: Medizinische Notwendigkeit vs. Hygiene | | 6 |
| H. Scholz | Antibiotika-Allergien: Welche Wirkstoffe kommen in Frage? | | 8 |
| H. Just | Ist die Kohortenisolierung von MRSA-Patienten zulässig? | | 11 |
| J. Dembinski | Hörscreening bei Säuglingen nach Aminoglykosidgabe | | 13 |
| C. Lübbert | Ist die antibiotische Lokalthherapie nach operativer Versorgung ausreichend? | | 14 |
| C. Geffers | Kann die präoperative Rasur im OP-Saal durchgeführt werden? | | 17 |
| B. Wille | Welche Maßnahmen werden beim Kontakt mit ESBL-Trägern im familiären Umfeld empfohlen? | | 19 |
| R. Strauß | Vermeidung rezidivierender Pneumonien bei pflegebedürftigen Patienten | | 21 |
| C. Brandt | Welche Anforderungen muss ein Sterilgutlager erfüllen? | | 24 |
| A. Krüger | Wie und mit welcher Lösung ist die SOD durchzuführen? | | 26 |
| R. Ganschow | Ausscheidungsdauer enteropathogener <i>E. coli</i> (EPEC) | | 29 |