

Immunthrombozytopenie (ITP).....3

Erhard Hiller, München

Die ITP lässt sich durch die Stimulierung der Megakaryozytopoese günstig beeinflussen

Follikuläres Lymphom6

Martin Dreyling, Karsten Spiekermann

Aktuelle Studien belegen mittlerweile ein medianes Gesamtüberleben von etwa 20 Jahren

Erythropoese-stimulierende Agenzien (ESAs).....9

Mohammad Resa Nowrousian

In der Onkologie sind ESAs lediglich zur Behandlung der mit Symptomen einhergehenden Chemotherapie-induzierten Anämie zugelassen

Lokoregionär fortgeschrittene Ösophagus-Karzinome..... 12

Frank Vogel, Stuttgart

Trimodale Therapie mit kombinierter neoadjuvanter Radiochemotherapie und Resektionsoperation

S3-Leitlinie Magenkarzinom..... 15

Wolfgang Schepp, München

Leitliniengemäße perioperative und adjuvante Therapien aus der im April 2011 veröffentlichten S3-Leitlinie

Palliativmedizin 18

Hans Pohlmann, München

Wichtige Entwicklungen und Erkenntnisse zu: Patientenverfügungen, Sterbebegleitung, Ausbau der SAPV, neue Optionen für die Schmerztherapie, Auswirkungen der Palliativmedizin auf die Lebensqualität

TZM intern..... 14

Termine der Manualvorstellungen 2011