

Magazin

- 194 Neue Therapien bei Typ-2-Diabetes
- 197 Verordnung von GLP1-Analoga nicht ändern
- 198 DDG stellt neue Leitlinie Schwangerschaftsdiabetes vor
- 198 Neues zu familiärem Risiko bei Typ-1-Diabetes

Nachgefragt

- 200 Indikatoren und Mediatoren – Welchen Stellenwert haben erhöhte Triglyzeridspiegel?

Praxismanagement

- 204 Gesundheit von Jungen und Männern – Medizin und Gesellschaft werden den Bedürfnissen nicht gerecht
- 205 „Innere Haltung“ – Erfolgsfaktor in der Kommunikation: Mitarbeiterführung – Innere Haltung – Instrument Kommunikation

Deutsche Diabetes-Stiftung (DDS)

- 232 EU-Projekt IMAGE – Typ-2-Diabetes – deutsche Fassung – Diabetes verhindern: Leitfaden für die Prävention

Forum der Industrie

- 234 Leitliniengerechte Therapie verbessert Alltagsfunktionalität
- 235 Theorie und Praxis – Versorgungsrealität der Diabetes-Patienten in Deutschland
- 236 Kardiovaskuläre Sicherheit: Kontrolle des Blutzuckers ohne Hypoglykämie und Gewichtszunahme
- 237 Pregabalin lindert den neuropathischen Schmerz
- 238 Frühe Kombination oraler Antidiabetika von Vorteil
- 238 Diabetestherapie ohne zusätzliches Hypoglykämierisiko

Editorial

- 191 Diabetes und Niere – nicht nur ein Mikroalbuminurieproblem
Bergmann A, Schwarz PEH; Dresden

Schwerpunkt

- 208 Diabetische Nephropathie – Aktuelle klinische Aspekte
Hasslacher C, Heidelberg
- 214 Hypoglykämie bei Diabetes mit Niereninsuffizienz – Ursachen und Vermeidungsstrategien
Kulozik F, Hasslacher C; Heidelberg
- 219 Blutzuckerkontrolle – Besonderheiten bei Niereninsuffizienz
Platten I, Smith B, Hasslacher C; Heidelberg
- 224 Blutzuckerselbstkontrolle beim multimorbiden Patienten – Praktische Probleme
Seltenreich U, Heidelberg
- 228 CME-Fragebogen