

**Neues Therapieregime beim Adenokarzinom der Zervix** Die Inzidenz des Adenokarzinoms ist gestiegen. Seine Prognose ist schlechter als die des Plattenepithelkarzinoms, und eine optimale Therapie wurde noch nicht entwickelt. Eine chinesische Forschergruppe hat ihre Ergebnisse zur Behandlung mit Radiochemotherapie plus neoadjuvanter und adjuvanter Chemotherapie mit Carboplatin und Paclitaxel kürzlich vorgestellt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie auf **Seite 758**



**Übelkeit nach dem Kaiserschnitt** Ca. jedes 3. Kind wird per Kaiserschnitt entbunden – somit ist die Sectio caesarea ein sehr häufiger operativer Eingriff. Verwunderlich ist, dass nicht klar ist, ob eine nachfolgende intraabdominelle Spülung mit NaCl-Lösung positive Wirkung zeigt. Wird die Infektionswahrscheinlichkeit reduziert? Hat die Spülung Einfluss auf das Wohlbefinden? Die Antworten hierzu finden Sie auf **Seite 766**

### GebFra Magazin

- 751 Editorial
- 753 **Aktuell referiert**
- 770 Buchtipps
- 774 Recht in der Praxis: Vertragsärzte fallen nicht unter die Korruptionstatbestände des Strafgesetzbuches
- DGGG**
- 777 Strukturpapier der DGGG
- 780 DGGG-Kommissionen im Porträt
- 785 Interview mit Dr. Gerhard Bartzke, Vorsitzender der BLFG
- 787 Interview mit Dr. Klaus König, 2. Vorsitzender des BVF
- 789 EBCOG und FIGO im Porträt
- 793 Personalia
- Geschichte der Gynäkologie**
- 795 Der Gynäkologe Ernst Gräfenberg – (missverstandener) Entdecker des G-Punktes


● Dieser Beitrag liegt zusätzlich in deutscher Sprache vor. Die PDF-Datei ist unter [www.thieme-connect.de/ejournals/toc/gebfra](http://www.thieme-connect.de/ejournals/toc/gebfra) zugänglich.

### GebFra HandsOn

- 798 Das ovarielle Überstimulationssyndrom
- Der interessante Fall**
- 802 Late-Onset OHSS nach intrazytoplasmatischer Spermiuminjektion

### GebFra Science




- 803 Editorial  
*M. W. Beckmann*
- 804 Prevention of Labour-Associated Pelvic Floor Injuries – What is Known for Sure
- ☞ Prävention geburtsbedingter Beckenbodenschädigung – Was ist gesichert?  
*H. B. G. Franz, C. Erxleben, A. Franz, R. Hofmann*
- 809 Chemotherapy-Induced Amenorrhoea – An Update
- ☞ Chemotherapieinduzierte Amenorrhö – ein Update  
*C. Liedtke, L. Kiesel*
- 819 Biomarkers in Breast Cancer – An Update
- ☞ Biomarker beim Mammakarzinom – ein Update  
*M. Schmidt, P. A. Fasching, M. W. Beckmann, H. Kölbl*



**Neue Technik für einen „alten“ Eingriff** Die postoperative Morbidität der Sectio caesarea ist gering. Komplikationen wie hohe intraoperative Blutverluste und Verletzungsgefahr für das Kind bei der Uterotomie gibt es jedoch trotz vereinfachter Technik in den vergangenen Jahren weiterhin. Durch eine Modifikation der Methode nach Misgav-Ladach können die Operationszeit verkürzt und der Blutverlust verringert werden, wie Vejnović, Costa und Ignatov berichten – siehe **Seite 840**

**Praxistipp zum ovariellen Überstimulationssyndrom** Das OHSS (ovarielles Hyperstimulationssyndrom) kann im Rahmen einer reproduktionsmedizinischen Maßnahme unter hCG-Stimulation auftreten. Bei ca. 0,2–5% der Frauen, die sich einer IVF oder ICSI unterziehen, tritt die schwere Form des Syndroms auf – diese kann sogar tödlich verlaufen. Möglichkeiten für Prophylaxe und Therapie finden Sie ab **Seite 798**

### GebFra Science

- 833 Risk-reducing Surgery in Women at Risk for Familial Breast or Ovarian Cancer  
 Prophylaktische Operationen bei familiärem Mamma- und Ovarialkarzinomrisiko  
*K. Rhiem, K. Pfeifer, R. K. Schmutzler, M. Kiechle*
- 840 New Technique for Caesarean Section  
*T. R. Vejnović, S. D. Costa, A. Ignatov*
-  Die Entwicklung einer modifizierten Technik für eine Sectio caesarea
- 846 Vitamins E, A and B<sub>2</sub> as Possible Risk Factors for Preeclampsia – under Consideration of the PROPER Study (“Prevention of Preeclampsia by High-Dose Riboflavin Supplementation”)  
*C. Elsen, C. Rivas-Echeverría, K. Sahland, R. Sánchez, L. Molma, L. Pahl, R. Wallinger, J. Volz, J. Wacker, J. Frühauf*
-  Vitamine E, A und B<sub>2</sub> als mögliche Risikofaktoren für Präeklampsie – unter Berücksichtigung der PROPER-Studie („Prevention of Preeclampsia by high dose Riboflavin Supplementation“)
- 853 Chylomicronemia Syndrome in Pregnancy: a Case Report of an Acute Necrotizing Pancreatitis  
*D. Bolla, V. Schyrba, G. Drack, A. Schöning, A. Stage, R. Hornung*

### GebFra Rubriken

- 856 GebFra Inside
- 861 Veranstaltungen
- 863 Impressum
- 865 Medizin & Markt
- 868 Letzte Seite



**Amenorrhö als Folge von Chemotherapie bei prämenopausalen Frauen** Auf die Beschwerden bei der Menstruation würden sicher gerne viele Frauen verzichten, doch mit dem vorzeitigen Eintreten der Menopause geht die Fertilität trotz möglicherweise bestehendem Kinderwunsch verloren, menopausale Symptome treten auf und das Risiko für verschiedene Krankheiten wird erhöht. Das Maß an einer chemotherapieinduzierten Amenorrhö variiert je nach angewandter Chemotherapie. Lüdtke und Kiesel bringen Sie auf den neuesten Stand in Bezug auf die CIA **Seite 809**