

DRITTE SEITE

Die Menschen in Griechenland leiden wirklich...	5
Bastonade-Folter: Schmerzen und Beeinträchtigungen bleiben	5
Führungspersönlichkeiten: Narzissmus ist gefragt!	5

ANGST-/PANIKERKRANKUNGEN

CME: Erfolgreiche Therapie des Zwangs: Bessern sich die depressiven Symptome von allein?	6
Soziale Phobie: Vorteile für die kognitive Therapie	6

EPILEPSIE

Therapieresistente fokale Anfälle: Erfolg durch frühe Kombination mit Lacosamid	7
CAVE: Verschlimmerung der Sturzanfälle durch antiepileptische Therapie	7

MULTIPLE SKLEROSE

Genetische MS-Risikomodelle: Klinischer Nutzen ist noch begrenzt	8
Intramuskuläres IFN β -1a: Langzeitvorteile durch frühe Behandlung	8

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

A Anwendungsbeobachtung	M Metaanalyse
C Fall-Kontroll-Studie	R Randomisiert-kontrollierte Studie
F Fallbericht	S Sonstige Studienarten
K Kohortenstudie	U Übersicht

STENO	8
-------	---

Therapie der RRMS: Nutzen-Risiko-Analyse zu Glatirameracetat	9
--	---

ADHS

CME: Therapieresistente Erwachsenen-ADHS: CBT mit großem Erfolg eingesetzt	12
Familiäres ADHS-Risiko und Komorbidität: Auch auf die Geschwister achten!	12

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

CME: Unipolare versus bipolare Depression: Unterschiede in Intelligenz und Bildung?	14
Depression bei älteren Patienten: Was tun bei Therapieversagen?	14

DEMENTIELLE SYNDROME

Therapie der Alzheimer-Demenz: NMDA-Antagonist hilft Angehörigen und spart Kosten	15
CAVE: Atypika bei Demenz: Kognitive Fähigkeiten werden beeinträchtigt	15
CME: Nächtliche Atemstörungen älterer Frauen: Das Demenz-Risiko ist deutlich erhöht	16
INTERNET-TIPPS Multiple Sklerose	16

SCHIZOPHRENIE

CME: Outcome über drei Jahre: Anhaltende Besserung nur bei jedem Zehnten?	17
Therapieabbrüche bei schizophrener Erstepisode: Depot versus orale Antipsychotika	17

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

CME: Neuropathischer Schmerz: Wie hilfreich ist der deutsche NPSI?	20
Cluster-Kopfschmerz: Injizierte Steroide in kleiner Studie erfolgreich	20
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG	20

PARKINSON-SYNDROME

Wearing-Off: Neuer Fragebogen zu fluktuierenden NMS	22
Rasagilin bei frühem Parkinson-Syndrom: Progression lässt sich verlangsamen	22
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG	22
Bilaterale Stimulation des GPi: Kamptokormie komplett beseitigt	23
Morbus Parkinson und Tremor: Differentialdiagnose mittels ¹²³ I-FP-CIT-SPECT?	23

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

CME: Dopaminergika-Therapie des RLS: Impulskontrollstörungen ein Problem?	24
RLS-Prävalenz: 4 Prozent oder doch knapp 30?	24

KONGRESS

DGPPN-Kongress, 23.–26. November 2011 in Berlin	25
---	----

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

CME: Schlaganfallpatienten: Bessere Prognose durch zusätzliche CT-Angiographie?	26
IM FOKUS	26

SUCHT

Riskanter Alkoholkonsum: Trauernde Männer in Gefahr	29
---	----

Impressum	29
-----------	----

Bestellcoupon	9
---------------	---

FÜR DIE PRAXIS	30
----------------	----

CME: Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen	31
--	----