

**Systemische
Therapie:
Neue Ent-
wicklungen
und Chancen**



Seite 3

© David McCarthy | SPL |
Agentur Focus

für eine Verbesserung • Seit 15 Jahren konnte die First-line-Therapie des Ovarialkarzinoms erstmals wieder verbessert werden: Der Angiogenesehemmer Bevacizumab verlängert in Kombination mit der Standardchemotherapie das progressionsfreie Überleben. Ob eine Verlängerung der Bevacizumab-Gabe über die zugelassenen 15 Monate sinnvoll ist, prüft die Studie AGO-OVAR 17. Die Studie OCEANS untersuchte die Wirksamkeit von Bevacizumab beim Spätrezidiv des Ovarialkarzinoms.

**34th SABCS, San Antonio,
TX/USA // 53rd ASH, San Diego,
CA/USA** • Kongressberichte

Seite 6/7

© National Cancer Institute |
SPL | Agentur Focus



Seite 8

**OPTIMAL-Studie:
Wirksamkeit von
Erlotinib als First-
line-Therapie** •

Internationale Literatur

Seite 9 **EMCC, Stockholm/
Schweden** • Kongressbericht

**PERIMAX-Studie:
Perioperative
Therapie mit
FOLFOXIRI und
Bevacizumab** •
Die aktuelle Studie



Seite 10

© Du Cane Medical Imaging Ltd |
SPL | Agentur Focus

Seite 11 **Langanhaltende Remis-
sion mit Bevacizumab-haltiger First-
line-Therapie** • Kasuistik

**Plasma-VEGF-A: Poten-
zieller prädiktiver Marker bei Mamma-
und Pankreaskarzinom** • Aktuelles

Seite 12